



CENTRO REGIONAL ANDINO

REGISTROS BIBLIOGRAFICOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE MOSCAS DE LAS FRUTAS (DIPTERA : TEPHRITIDAE) EN LOS PAISES SURAMERICANOS



Por

Carlos Lobos Aguirre
Consultor

VERSION REVISADA
Agosto de 1999

Lima, Perú



**REGISTROS BIBLIOGRAFICOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE MOSCAS DE LAS
FRUTAS (DIPTERA : TEPHRITIDAE) EN LOS PAISES SURAMERICANOS**

Documento preparado por el I.A. Carlos R. Lobos Aguirre, Consultor del IICA.
Centro Regional Andino - Avenida Paseo de la República No. 3211, Piso 6, San Isidro,
Lima (Perú), telefax : 4.22.70.98

ISNN 92- 9039-398 X

This One



THE
WYOMING
STATE
LIBRARIES

CONTENIDO

	Pág.
NOTA INTRODUCTORIA A LA VERSIÓN REVISADA.....	i
PREFACIO.....	ii
NOTA DE PRESENTACIÓN.....	iii
I. RESUMEN	01
II. INTRODUCCION	02
III. ESPECIES DE MOSCAS DE LAS FRUTAS DE LOS GENEROS <i>Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis, Rhagoletis y Toxotrypana</i> , POR PAISES DE AMERICA DEL SUR	05
3.1 Argentina	05
3.2 Bolivia	10
3.3 Brasil.....	12
3.4 Colombia	22
3.5 Chile	25
3.6 Ecuador.....	28
3.7 Guayana Francesa	32
3.8 Guyana (Ex-Guiana Británica).....	33
3.9 Paraguay.....	35
3.10 Perú.....	37
3.11 Suriname	42
3.12 Uruguay.....	44
3.13 Venezuela	45
IV. LISTADO EN ORDEN ALFABÉTICO DE ESPECIES DE LOS GENEROS <i>Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis,</i> <i>Rhagoletis y Toxotrypana</i> , REPORTADAS PARA AMERICA DEL SUR POR PAISES	49
4.1 Listado en orden alfabético, de especies del género <i>Anastrepha</i> Schiner, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.....	49
4.2 Listado en orden alfabético, de especies del género <i>Bactrocera</i> Macquart, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.	53
4.3 Listado en orden alfabético, de especies del género <i>Ceratitis</i> MacLeay, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.....	53
4.4 Listado en orden alfabético, de especies del género <i>Rhagoletis</i> Loew, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.	54
4.5 Listado en orden alfabético, de especies del género <i>Toxotrypana</i> Gerstaecker, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.....	54
V. REFERENCIAS	55

NOTA INTRODUCTORIA A LA VERSION REVISADA

El documento original "DISTRIBUCION Y REGISTROS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE MOSCAS DE LAS FRUTAS (DIPTERA : TEPHRITIDAE EN LOS PAISES SURAMERICANOS", fue elaborado en octubre de 1997, y distribuido de manera limitada en diciembre del mismo año a través de las Representaciones del IICA en los distintos países del hemisferio, con el fin de someterlo a consulta en dicho países, para recoger observaciones y propuestas documentadas de eventuales modificaciones en los registros o de adiciones a introducir en su texto.

Como resultado de lo anterior, se recibieron contadas observaciones de algunos países, las que han sido adecuadamente consideradas en la presente versión.

En esta versión se han incluido también, por otra parte, nuevos antecedentes sobre el tema, recopilados de la información bibliográfica publicada y obtenida entre diciembre de 1997 y la fecha.

Se considera oportuno destacar, como ha sido definido desde un comienzo, que este documento no consideró jamás el propósito de ser un listado de especies de importancia económica y/o cuarentenaria de este grupo de insectos, asunto que compete evaluar a las instancias nacionales y regionales de Protección Fitosanitaria. Su objetivo, por el contrario, ha sido el de tratar de confeccionar un recuento actualizado de los registros que aparecen en la bibliografía internacional sobre algunas especies de cinco géneros pertenecientes a la familia Tephritidae para Sudamérica, antecedentes que se encuentran al libre alcance de todos los interesados en el tema.

Se precisa, asimismo, que como norma de trabajo para el presente manual se ha utilizado el criterio internacionalmente aceptado según el cual para cualquier modificación de la información contenida en los listados (sobre todo en el caso de que haya necesidad de rectificar el registro de una especie citada para un país), se mantenga el registro original con la inclusión en el texto de las aclaraciones respectivas, a fin de dar mayor claridad, transparencia y utilidad de la información recopilada.

No está por demás advertir que, de acuerdo a la evolución de los estudios realizados por los especialistas en taxonomía de la familia Tephritidae, donde se incluyen ya análisis de aspectos moleculares o genéticos para identificar especies, es previsible esperar cambios en la denominación específica de algunas especies, en especial entre aquellas consideradas actualmente como "complejos" (como es el caso de *Anastrepha fraterculus*). Estas eventuales modificaciones podrían hacer necesario revisar y reajustar nuevamente este listado en el futuro.

Carlos Lobos Aguirre
Consultor

Santiago (Chile), agosto de 1999

PREFACIO

Los cambios en el contexto internacional y regional obligan a todas las instituciones, sin excepción, a revisar sus estrategias y estructuras, a fin de adecuarlas a las nuevas circunstancias.

El IICA, que está cumpliendo más de medio siglo de trayectoria ininterrumpida en apoyo a los países de las Américas para la promoción del desarrollo agropecuario y rural, está en un profundo proceso de transformación institucional que tiene como objetivo principal optimizar la efectividad de los servicios de cooperación técnica.

Desde el punto de vista estratégico, el IICA está planteando la necesidad de revalorizar el papel de la agricultura, sector al que hay que visualizar de manera ampliada, reconociendo los múltiples vínculos que la producción primaria ha generado con el resto de la economía. Bajo este nuevo enfoque, adquieren especial importancia los aspectos de competitividad, equidad y sostenibilidad.

Desde el punto de vista estructural, se ha elegido el camino de la descentralización como un medio para generar acciones de mayor impacto en un contexto de creciente limitación de recursos. Esto se ha plasmado en la creación de cinco Centros Regionales en que se divide la labor del IICA a nivel del Hemisferio Americano.

El Centro Regional Andino (CReA), que integra y potencia la labor de las Agencias de Cooperación Técnica nacionales que el IICA posee en las hermanas naciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, está desarrollando una estrategia regional, basada en las orientaciones de la demanda, la cual asigna una especial importancia a las acciones en el campo de la Sanidad Agropecuaria.

Podría señalarse, sin temor a equívocos, que esta disciplina se ha convertido en un tema vital para la dinamización del comercio agropecuario internacional, no sólo en lo que hace a la evolución de los procesos de integración subregional y hemisférica, sino también como factor para propiciar la debida inserción en el contexto global.

A través de la presente publicación técnica, el CReA refuerza su compromiso de apoyo a los países andinos en estas importantes materias.

Manuel Otero
Director del Centro Regional Andino

NOTA DE PRESENTACION

Las Moscas de las Frutas constituyen un grupo biológico dentro del cual se cuentan numerosas especies, entre las cuales no todas tienen la misma significación desde el punto de vista económico y cuarentenario. La incidencia que algunas de ellas tienen sobre el comercio internacional de productos hortofrutícolas, explica la importancia creciente que se otorga hoy en el mundo al estudio de la familia Tephritidae.

Por ello resulta ampliamente justificado y útil todo esfuerzo tendiente a mejorar el conocimiento sobre diversos aspectos relacionados con las Moscas de las Frutas, como el que representa la presente publicación, con la que se pretende poner al día el inventario de los registros sobre las especies de Moscas de las Frutas que han sido publicados en la bibliografía internacional para el territorio suramericano.

El estudio ha sido preparado por el Ingeniero Agrónomo Carlos Lobos Aguirre, Consultor del IICA y profesional de amplia trayectoria y reconocida competencia en el tema en el ámbito hemisférico, y se ha llevado a cabo con base en una exhaustiva revisión actualizada de la información bibliográfica que se encuentra al alcance de la comunidad internacional interesada en la materia.

Se espera, por lo mismo, que por su seriedad y su repaldo documental debidamente acreditado, el trabajo sea de mucha utilidad para apoyar iniciativas y acciones de los países alrededor del asunto.

Por la naturaleza de la publicación se tiene previsto revisar y actualizar su texto, tomando en consideración para el efecto tanto las propuestas documentadas que puedan formular los Servicios Nacionales de Sanidad Vegetal, los Organismos Regionales de Protección Fitosanitaria, y los investigadores en la especialidad, como los registros nuevos que vayan apareciendo en la bibliografía internacional.

El Centro Regional Andino del IICA, en observancia de su política de proveer a los países andinos y a la comunidad interamericana de información técnica debidamente sustentada sobre temas de interés – como el de las Moscas de las Frutas – entrega este manual con la esperanza de que sea apreciado y reconocido como un valioso material de referencia.

**Javier Esparza Duque
Especialista Regional en Sanidad Agropecuaria**

REGISTROS BIBLIOGRAFICOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE MOSCAS DE LAS FRUTAS (DIPTERA : TEPHRITIDAE) EN LOS PAISES SURAMERICANOS

I. RESUMEN

Se presentan listados de las especies de Moscas de las Frutas de los géneros *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* y *Toxotrypana* reportadas para los distintos países de América del Sur. Estos listados fueron elaborados en base a una revisión de la literatura publicada sobre moscas de la fruta en diversos medios.

Del total de las especies registradas para América del Sur en esta revisión (172), un 85,5% (147) están incluidas en el género *Anastrepha*, seguidas por el género *Rhagoletis* con un 8,7% (15 especies).

I. SUMMARY

List of fruit fly species of the *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* and *Toxotrypana* genera reported for the different South American countries are submitted. The lists were elaborated on the basis of a revision of literature on fruit flies published in diverse media.

Of the total species recorded for South America in this revision (172), 85,5% (147) correspond to the *Anastrepha* genus, followed by 8,7% (15 species) of the *Rhagoletis* genus.

II. INTRODUCCIÓN

En América del Sur, se conocen varias especies de Moscas de las Frutas (Diptera: Tephritidae), la mayoría de las cuales se incluyen en el género *Anastrepha* y, en menor número, en los géneros *Rhagoletis* y *Toxotrypana*, todos endémicos del área. Además de estas especies, se encuentra presentes desde hace varios años, la Mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*, Wiedemann) y, más recientemente, la Mosca de la Carambola (*Bactrocera caramboleae*, Drew y Hancock), ambas exóticas del continente.

Debido a la importancia que se asigna a las Moscas de las Frutas, se ha considerado oportuno recopilar en un solo documento los antecedentes disponibles sobre los reportes publicados de las distintas especies para los países suramericanos. Con este objetivo, se realizó un análisis y procesamiento de la numerosa información publicada sobre el tema, tanto de las obras de revisión más importantes que se conocen, como de los trabajos específicos realizados a nivel local, y que contienen antecedentes de interés para el objetivo ya señalado. En este sentido, se utilizaron solo referencias publicadas formalmente y que están accesibles a los usuarios a nivel internacional.

Igualmente, y en atención a su importancia relativa, los antecedentes del trabajo se restringen a las especies de Moscas de las Frutas incluidas en los géneros *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* y *Toxotrypana*.

Para la denominación taxonómica de las especies de cada género, se utilizaron como referencia los estudios más recientes publicados por los especialistas en el tema. En el caso del género *Anastrepha*, se emplearon los trabajos de Steyskal (1977b), Norrbom y Kim (1988a), y Hernández y Alija (1993); para el género *Rhagoletis* el de Foote (1981), y en el género *Toxotrypana*, lo indicado por Blanchard (1959). Los géneros *Bactrocera* y *Ceratitis*, están representados actualmente por una especie cada uno, la Mosca de la Carambola (*Bactrocera caramboleae*, Drew y Hancock, 1991) y la Mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*, Wiedemann, 1824).

Como una forma de facilitar la consulta de los antecedentes incluidos en esta revisión, su presentación se ha dividido en dos partes :

- a) En una primera parte, se entregan los antecedentes por país, con un detalle sobre los reportes publicados para las distintas especies, indicando en cada caso la fuente de información respectiva.
- b) En una segunda parte , se entrega un listado en orden alfabético de las especies de los géneros *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* y *Toxotrypana* presentes en América del Sur, indicando para cada una, los países donde se reporta su presencia.

Presentación de la información

La información es entregada en listados, con el fin de facilitar su consulta, donde se incluyen los siguientes antecedentes:

a) Especie de Mosca de las Frutas

Se entrega su nombre científico, el que de acuerdo a la literatura revisada sería el válido a la fecha.

En el caso de nombres considerados sinonimias, éstos se incluyen solo en la segunda parte del trabajo, y se indican con un asterisco; en el espacio correspondiente a los reportes por país, se señala el nombre válido que se deberá consultar.

Ejemplos :

<i>A. bahiensis</i> Costa Lima, 1937	Brasil, Colombia, Ecuador, Perú
* <i>A. balluo</i> Stone, 1942	ver <i>A. bezzii</i>
* <i>A. barandiaranae</i> Korytkowski y Ojeda, 1968	ver <i>A. atrox</i>
<i>A. barbiellini</i> Costa Lima, 1938	Argentina, Brasil, Perú

b) Reportes de cada especie

En la primera parte del trabajo, se entrega información detallada sobre los reportes por país para cada especie, de acuerdo a los datos de las referencias. Los antecedentes se entregan según el siguiente detalle:

PAÍS: se indica cuando se dispone de referencias que citan sólo su reporte a este nivel. Se escribe en mayúsculas y negrita.

ESTADO, PROVINCIA, REGIÓN (o la división administrativa que sigue a país): se escribe en mayúsculas y negrita.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA (o división administrativa que sigue a la anterior): se escribe en mayúscula y sin negrita.

Localidad específica: se escribe en minúsculas y sin negrita.

Ejemplos :

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Anastrepha aczeli</i> Blanchard, 1961	TUCUMÁN (Blanchard, 1961)
4. <i>Anastrepha daciformis</i> Bezzi, 1909	BOLIVIA (Foote, 1967; Hernández et al., 1993)
10. <i>Rhagoletis penela</i> Foote, 1981	VIII REGIÓN: ARAUCO: Pichimahuel (Foote, 1981)

En la segunda parte, se señalan la reportes de la especie solo a nivel de país, sin incluir las referencias.

c) **Referencias**

Las referencias bibliográficas de las cuales se obtuvo cada reporte, se anotan luego de la correspondiente localidad, con el propósito de especificar claramente la procedencia del dato, señalando el autor y el año de la publicación. El detalle de cada publicación se entrega en el capítulo de REFERENCIAS de este trabajo.

d) **Información adicional**

En algunos casos, se agrega una indicación especial luego del reporte o de la referencia, la que se señala con una letra mayúscula, de conformidad con el siguiente significado:

- D: Reporte dudoso.
- E: Especie erradicada del área en referencia.
- A: Existencia de áreas libres de esa especie en el área en referencia.

Ejemplos:

<i>Anastrepha alveata</i> Stone, 1942	Argentina-D, Brasil, Venezuela
<i>A. fraterculus</i> (Wiedemann), 1830	Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile-E, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela
<i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	Argentina, Bolivia, Brasil-A, Colombia, Ecuador-A, Paraguay, Perú, Venezuela

III. ESPECIES DE MOSCAS DE LAS FRUTAS DE LOS GENEROS *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* y *Toxotrypana*, POR PAISES DE AMERICA DEL SUR

Tal como se ha explicado en las páginas precedentes, los listados que se presentan a continuación contienen el detalle de los registros que se encuentran en la bibliografía internacional sobre las distintas especies de Moscas de las Frutas de los cinco géneros seleccionados para cada uno de los países de América del Sur.

Los referidos listados, por lo tanto, no consideran la calificación o categorización de la importancia económica o cuarentenaria que pueda corresponder a cada una de las especies anotadas – asunto que, por lo demás, es de la competencia de los Servicios Nacionales y/o las Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria –.

3.1 ARGENTINA ⁽¹⁾ y ⁽²⁾

Argentina-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. aczeli</i> Blanchard, 1961	TUCUMÁN (Blanchard, 1961)
2. <i>A. alveata</i> Stone, 1942	LA RIOJA: Patquía (Stone, 1942; Blanchard, 1961-D)
3. <i>A. alveatoides</i> Blanchard, 1961	CÓRDOBA (Blanchard, 1961); JUJUY: EL CARMEN (Rosillo, 1953)
4. <i>A. barbiellinii</i> Costa Lima, 1938	CORRIENTES (Blanchard, 1961); MISIONES (Stone, 1942; Blanchard, 1961); SAN LUIS (Blanchard, 1961)
5. <i>A. chilcayae</i> Greene, 1934	SALTA: (Blanchard, 1961), CAMPO SANTO, ORÁN, CAFAYATE (Rosillo, 1953); JUJUY: (Blanchard, 1961), EL CARMEN (Rosillo, 1953), Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989); CATAMARCA: SANTA MARÍA (Rosillo, 1953)
6. <i>A. consobrina</i> (Loew), 1873	SALTA: Aguaray (Blanchard, 1961)

(1) Mediante NOTA SENASA No. 1467/98 (10 de junio de 1998), el Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria solicitó efectuar una aclaración internacional en el sentido de que de acuerdo con el Listado de Plagas Cuarentenarias A1 para Argentina, aprobado desde octubre de 1994 por el Comité Directivo del COSAVE, las únicas especies de Moscas de las Frutas de importancia cuarentenaria que tendrían presencia reconocida en dicho país serían *A. fraterculus* y *C. capitata*.

(2) Con ocasión de las Reuniones XXIII (Salvador, Brasil) y XXV (Asunción, Paraguay) del Consejo Directivo del COSAVE, los miembros del mismo, al considerar la presente publicación como si fuera un listado de plagas cuarentenarias – que no lo es, ni ha pretendido serlo – manifestaron algunas inquietudes en relación con los listados de especies de Moscas de las Frutas reportados en la bibliografía internacional para los cinco países del Cono Sur, plantearon su deseo de que pudieran ser modificados en función de los Listados A1 y A2 de Plagas Cuarentenarias del COSAVE, y ratificaron la vigencia de estos últimos Listados mediante Resolución No. 144-23/98D, con el reconocimiento de ellos “como el único documento referencial de esta materia y como instrumento básico de negociación en el intercambio comercial de productos agrícolas”.

Argentina-2

Especie	Reportes y referencias
7. <i>A. daciformis</i> Beazzi, 1909	TUCUMÁN (Blanchard, 1961); SALTA : ORÁN (Rosillo, 1953; Blanchard, 1961), Urundel (Blanchard, 1961), CORRIENTES : Bella Vista (Blanchard, 1961)
8. <i>A. dissimilis</i> Stone, 1942	CORRIENTES : Bella Vista (Blanchard, 1961); ENTRE RÍOS (Blanchard, 1961); FORMOSA (Blanchard, 1961); MISIONES (Blanchard, 1961); SANTIAGO DEL ESTERO (Blanchard, 1961); TUCUMÁN (Blanchard, 1961); SALTA (Blanchard, 1961); JUJUY (Blanchard, 1961), Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989)
9. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	ARGENTINA (Korytkowski, 1993)
10. <i>A. elegans</i> Blanchard, 1937	CORRIENTES : (Blanchard, 1961), Jaguarete (Stone, 1942); ENTRE RÍOS (Blanchard, 1961); MISIONES (Blanchard, 1961)
11. <i>A. ethalea</i> (Walker), 1849	MISIONES (Blanchard, 1961 - D)
12. <i>A. flavipennis</i> Greene, 1934	SANTA FÉ (Blanchard, 1961)
13. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	JUJUY : León, Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989), SAN SALVADOR, EL CARMEN, SAN ANTONIO, VALLE GRANDE, LEDESMA (Rosillo, 1953); ENTRE RÍOS : Concordia (Vaccaro 1978, Putruele, 1996), Federación (Vaccaro, 1978); SALTA : CAPITAL, LA CALDERA, CERRILLOS, CAMPO SANTO, CAFAYATE, ORÁN, ROSARIO DE LERMA (Rosillo, 1953); CORDOBA (Chiesa Molinari, 1942; CIE, 1958a); SAN JUAN (Chiesa Molinare, 1942, CIE, 1958a); SAN LUIS (Chiesa Molinare, 1942, CIE 1958a); MENDOZA (Chiesa Molinare, 1942); CATAMARCA : SANTA MARÍA (Rosillo, 1953); TUCUMÁN (Chiesa Molinari, 1942), Famaillá (Nasca et al., 1983); CORRIENTES : Bella Vista (Rosillo et al., 1971)
14. <i>A. goldbachi</i> Blanchard, 1961	TUCUMÁN : Burruyacu (Blanchard, 1961)
15. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	MISIONES : Loreto, Puerto Victoria (Blanchard, 1961), Montecarlo (Blanchard, 1961; Norrbom, 1991); ENTRE RÍOS : Concordia (Blanchard, 1961); SALTA : Tartagal (Blanchard, 1961)
16. <i>A. haywardi</i> Blanchard, 1937	ENTRE RÍOS : Concordia (Stone, 1942; Blanchard, 1961); CORRIENTES (Blanchard, 1961); MISIONES : Posadas (Blanchard, 1961)
17. <i>A. irradiata</i> Blanchard, 1961	CORRIENTES : Yaguaretá (Blanchard, 1961)
18. <i>A. kuhlmanni</i> Costa Lima, 1934	MISIONES : Loreto (Stone, 1942; Blanchard, 1961); SANTA FÉ (Blanchard, 1961)
19. <i>A. lutzi</i> Costa Lima, 1934	TUCUMÁN (Stone, 1942; Blanchard, 1961)

20. <i>A. macrura</i> Hendel, 1914	MISIONES: Loreto (Blanchard, 1961)
21. <i>A. mburucuyaæ</i> Blanchard, 1961	SANTA FÉ: Reconquista (Blanchard, 1961); SANTIAGO DEL ESTERO (Blanchard, 1961)
22. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	MISIONES: Zaimán (Blanchard, 1961); JUJUY: Calilegua (Blanchard, 1961); CORRIENTES (Blanchard, 1961)
23. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	CORRIENTES (CIE, 1958b); JUJUY: León, Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989)
24. <i>A. pastranai</i> Blanchard, 1961	JUJUY: Santa Bárbara (Blanchard, 1961)
25. <i>A. pickeli</i> Costa Lima, 1934	SALTA (Blanchard, 1961); JUJUY (Blanchard, 1961); MISIONES (Blanchard, 1961)
26. <i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	TUCUMÁN (Blanchard, 1961)
27. <i>A. punctata</i> Hendel, 1914	TUCUMÁN: Cruz Alta, Picara Pintada, Tafí, Burruyacu, Faimallá (Blanchard, 1961); CORRIENTES: Bella Vista (Blanchard, 1961); JUJUY (Blanchard, 1961), EL CARMEN, SAN SALVADOR (Rosillo, 1953); SALTA (Blanchard, 1961); CHACO (Blanchard, 1961); MISIONES (Blanchard, 1961)
28. <i>A. repanada</i> Blanchard, 1961	SANTA FÉ (Blanchard, 1961)
29. <i>A. rosilloi</i> Blanchard, 1961	JUJUY: EL CARMEN (Blanchard, 1961), LEDESMA (Rosillo, 1953); SALTA (Blanchard, 1961); TUCUMÁN (Blanchard, 1961)
30. <i>A. schultzi</i> Blanchard, 1938	TUCUMÁN: (Blanchard, 1961); SALTA (Blanchard, 1961), LA CALDERA, CERRILLOS, CAMPO SANTO, ROSARIO de LERMA, ORÁN (Rosillo, 1953); JUJUY: (Blanchard, 1961), EL CARMEN, LEDESMA (Rosillo, 1953), León, Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989); CATAMARCA (Blanchard, 1961); MISIONES (Blanchard, 1961)
31. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	TUCUMÁN: Timbo Viejo, Los Pocitos (Blanchard, 1961); SALTA: Tartagal (Blanchard, 1961)
32. <i>A. turicai</i> Blanchard, 1961	TUCUMÁN: Colalao del Valle (Blanchard, 1961)
33. <i>A. umbrosa</i> Blanchard, 1961	MISIONES: Posadas (Blanchard, 1961)
33.1. <i>A. undosa</i> Stone, 1942	Piedras Blancas (Piedra B. de Stone, 1942- D, Blanchard, 1961 - D), localidad mal determinada según Foote, 1967 no corresponde a Argentina.
34. <i>A. zernyi</i> Costa Lima, 1934	CORRIENTES: Bella Vista (Blanchard, 1961); MISIONES: Posadas (Blanchard, 1961); SANTA FÉ (Blanchard, 1961)

Argentina-4

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Argentina (Aruani et al., 1996).	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	JUJUY: EL SALVADOR, EL CARMEN, LEDESMA (Rosillo, 1953), Quabrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989); TUCUMÁN: Famaillá (Nasca et al., 1983), Capital, El Siambón, Sauce Huacho, La Florida, Yerba Buena, Lules, Tafí Viejo, Las Cejas, Santa Ana, Horco Molle, San Javier, El Timbó, Burrucayu, Los Pérez (Fernández et al., 1984); BUENOS AIRES: Capital (Bréthes, 1913, CIE, 1967, 1984); CORDOBA (CIE, 1967); CORRIENTES (CIE, 1967), Bella Vista (Rosillo et al., 1971); SANTA FÉ (CIE, 1967); ENTRE RÍOS (CIE, 1967; Putruele, 1996), Concordia (Putruele et al., 1993), Chajará (Vaccaro, 1978); LA RIOJA (CIE, 1967); SALTA: CAPITAL, CAMPO SANTO, ORÁN, CHICOANA, CAFAYATE (Rosillo, 1953); CATAMARCA: SANTA MARÍA (Rosillo, 1953); MENDOZA (Aruani et al., 1996); SAN JUAN (Aruani et al., 1996); VALLES ANDINO PATAGÓNICOS, se declaran como libres de moscas de la fruta (área incluida entre el paralelo 40° 30' latitud sur; el meridiano 71° longitud oeste, el límite con Chile y el Canal de Beagle por el sur. El área incluye sectores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego (SENASA, 1999).

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. blanchardi</i> Aczél, 1954	JUJUY: Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., 1989); SALTA: Urundel (Foote, 1981); CÓRDOBA: Sierra de Córdoba (Foote, 1981); TUCUMÁN (Foote, 1967)
2. <i>R. ferruginea</i> Hendel, 1927	BUENOS AIRES: Brazo Largo, San Miguel (Foote, 1967); ARGENTINA (ENTRE RÍOS, en mapa) (Foote, 1981)
2.1. <i>R. ochraspis</i> Wied., 1930	<i>Nomen dubium</i> (Foote, 1981)
3. <i>R. willinki</i> Aczél, 1950	NEUQUÉN: Villa Angostura (Foote, 1981)

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Toxotrypana australis</i> Blanchard, 1959	TUCUMÁN (Blanchard, 1959); CORRIENTES (Foote, 1967), Bella Vista (Blanchard, 1959); BUENOS AIRES (Blanchard, 1959; Foote, 1967); SANTIAGO DEL ESTERO (Foote, 1967), La Banda (Blanchard, 1959)
2. <i>T. littoralis</i> Blanchard, 1959	CORRIENTES (Blanchard, 1959)
3. <i>T. picciola</i> Blanchard, 1959	TUCUMÁN (Blanchard, 1959)
4. <i>T. proseni</i> Blanchard, 1959	JUJUY: León (Manero et al., 1989); BUENOS AIRES: Punta Lara (Blanchard, 1959)
5. <i>T. pseudopicciola</i> Blanchard, 1959	CORDOBA (Blanchard, 1959)
6. <i>T. nigra</i> Blanchard, 1959	JUJUY: Quebrada de Huamahuaca (Manero et al., ENTRE RIOS: Concordia (Blanchard, 1959)

3.2 BOLIVIA

Bolivia-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. conjuncta</i> Hendel, 1914	LA PAZ: Mapiri (Greene, 1934)
2. <i>A. daciformis</i> Bezzi, 1909	BOLIVIA (Foote, 1967; Hernández et al., 1993)
3. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	COCHABAMBA (CIE, 1958a); TARIJA (CIE, 1958a)
4. <i>A. freidbergi</i> Norrbom, 1993	BOLIVIA (Hernández et al., 1993)
5. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	BOLIVIA: Carioca (Stone, 1942); LA PAZ: Mapiri, Sarampioni, Yungas de Coroico (Norrbom, 1991); CHUQUISACA: Sucre (Norrbom, 1991)
6. <i>A. hermosa</i> Norrbom & Kim, 1988	BOLIVIA San Antonio (Norrbom et al., 1988b)
7. <i>A. leptozena</i> Hendel, 1914	LA PAZ: Mapiri (Greene, 1934), San Antonio (Stone, 1942)
8. <i>A. nigripalpis</i> Hendel, 1914	LA PAZ: Mapiri, San Antonio (Greene, 1934)
9. <i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	BENI: Rurrenabaque (Greene, 1934; Stone, 1942-D)
10. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	BENI: Cavinas (Greene, 1934)
11. <i>A. undosa</i> Stone, 1942	BOLIVIA: Río Paraguay (Foote, 1967); SANTA CRUZ: Piedra Blanca, 4 millas al este de Corumbá (Foote, 1967)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Bolivia.	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	BOLIVIA (Foote, 1967; CIE, 1967, 1984)

Especies del género ***Rhagoletis***, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. blanchardi</i> Aczél, 1954	COCHABAMBA (Foote, 1981)
2. <i>R. rhytida</i> Hendel, 1914	LA PAZ: La Paz, Yungas (Foote, 1967; 1981)

Especies del género ***Toxotrypana***, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Bolivia.	

3.3 BRASIL⁽¹⁾

Brasil-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. alveata</i> Stone, 1942	RIO GRANDE DO NORTE:(Morgante, 1991), Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); BAHÍA (Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991)
2. <i>A. ambigua</i> Norrbom, 1985	BRASIL: (Korytkowski, 1993-D)
3. <i>A. amita</i> Zucchi, 1979	DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahier, 1991)
4. <i>A. annis</i> Stone, 1942	RIO DE JANEIRO: Itatiaia (Stone, 1942)
5. <i>A. antunesi</i> Costa Lima, 1938	BAHÍA: Piraja (Stone, 1942); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); PARÁ: Belém (Morgante et al., 1980), Belém (Mosqueiros), Santa Isabel do Pará (Zucchi et al., 1996)
6. <i>A. atrigona</i> Hendel, 1914	AMAZONAS: Manaus (Greene, 1934; Norrbom, 1991), Rio Amazonas (Stone, 1942); PARÁ: Monte Alegre, Prainha (Greene, 1934), Santarém, Obidios, Prainha, Monte Alegre (Norrbom, 1991); RORAIMA: Rio Branco, Mt. Roraima, (Norrbom, 1991)
7. <i>A. bahiensis</i> Costa Lima, 1937	BAHÍA (Stone, 1942); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); SAO PAULO: Monte Alto (Galli et al., 1996)
8. <i>A. barbiellinii</i> Costa Lima, 1938	RIO GRANDE DO SUL: Nueva Teutonia (Stone, 1942); SAO PAULO: Campinao (Stone, 1942), Pirassununga (Fernandes et al., 1993); SANTA CATARINA (Foote, 1967)
9. <i>A. barnesi</i> Aldrich, 1926	DISTRITO FEDERAL (Stone, 1942); RIO DE JANEIRO: Guanabara (Foote, 1967); SAO PAULO: Sao Carlos (Morgante et al., 1980)
10. <i>A. barretoi</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Korytkowski, 1993; Hernández et al., 1993)

(1) Con ocasión de las Reuniones XXIII (Salvador, Brasil) y XXV (Asunción, Paraguay) del Consejo Directivo del COSAVE, los miembros del mismo, al considerar la presente publicación como si fuera un listado de plagas cuarentenarias – que no lo es, ni ha pretendido serlo – manifestaron algunas inquietudes en relación con los listados de especies de Moscas de las Frutas reportados en la bibliografía internacional para los cinco países del Cono Sur, plantearon su deseo de que pudieran ser modificados en función de los Listados A1 y A2 de Plagas Cuarentenarias del COSAVE, y ratificaron la vigencia de estos últimos Listados mediante Resolución No. 144-23/98D, con el reconocimiento de ellos “como el único documento referencial de esta materia y como instrumento básico de negociación en el intercambio comercial de productos agrícolas”.

11. <i>A. belenensis</i> Zucchi, 1979	PARÁ: Belém (Zucchi et al., 1996)
12. <i>A. benjamini</i> Costa Lima, 1938	BAHÍA: Agua Preta (Stone, 1942); DISTRITO FEDERAL: Campo Grande (Stone, 1942); RIO DE JANEIRO: Guanabara (Foote, 1967)
13. <i>A. bezii</i> Costa Lima, 1934	RIO DE JANEIRO: Manguinhos (Stone, 1942), Guanabara , Río de Janeiro (Foote, 1967); GOIÁS (Stone, 1942); MINAS GERAIS: Viçosa (Norrbon, 1991)
14. <i>A. binodosa</i> Stone, 1942	PARÁ: Santarém, Río Tapajos (Stone, 1942), Belém (Zucchi et al., 1996); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996)
15. <i>A. bistrigata</i> Bezzi, 1919	SAO PAULO (Stone, 1942; Morgante, 1991), Campinas (Morgante et al., 1980), Riberao Preto, Sertaozinho, Bebedouro, San Antonio de Alegria (Bressan et al., 1991); MINAS GERAIS (Morgante, 1991), Belo Horizonte (Stone, 1942); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); RIO DE JANEIRO (Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GOIÁS (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991).
16. <i>A. bivittata</i> (Macquart), 1843	PARÁ (Greene, 1934); BRASIL (Stone, 1942-D)
17. <i>A. bondari</i> Costa Lima, 1934	BAHÍA (Stone, 1942)
18. <i>A. borgmeieri</i> Costa Lima, 1934	RIO DE JANEIRO (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967)
19. <i>A. caudata</i> Stone, 1942	SAO PAULO (Stone, 1942)
20. <i>A. concava</i> Greene, 1934	PARÁ: Santarém (Stone, 1942)
21. <i>A. connexa</i> Costa Lima, 1934	SAO PAULO (Stone, 1942)
22. <i>A. consobrina</i> (Loew), 1873	RIO DE JANEIRO (Greene, 1934), Estréla (Foote, 1967)
23. <i>A. costalimai</i> Autuori, 1936	SAO PAULO: Campo Bello, Santo Amaro (Stone, 1942)
24. <i>A. cruzi</i> Costa Lima, 1934	AMAZONAS: Río Amazonas (Stone, 1942 - D; Zucchi et al., 1996)
25. <i>A. curitis</i> Stone, 1942	PARÁ (Stone, 1942); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996)
26. <i>A. daciformis</i> Bezzi, 1909	SAO PAULO (Greene, 1934; Hernández et al., 1993); Monte Alto (Galli et al., 1996)

Brasil-3

27. <i>A. dissimilis</i> Stone, 1942	PERNAMBUCO: (Morgante, 1991), Província Bonito (Stone, 1942); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); PARÁ: Belém (Zucchi et al., 1996); RIO GRANDE DO NORTE: (Morgante, 1991), Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); BAHIA (Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHÃO (Morgante, 1991); MINAS GERAIS: Monte Verde (Morgante et al., 1980)
28. <i>A. distans</i> Hendel 1914	SAO PAULO: Piracicaba, Campinas, Louviera (Greene, 1934); BAHIA: Matula, Salvador, Cabulla (Greene, 1934)
29. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	RIO DE JANEIRO (Stone, 1942; Morgante, 1991)), Guanabara (Foote, 1967), Itaguaí (Aguiar et al., 1996); MINAS GERAIS (Morgante, 1991), Viçosa (Stone, 1942); SAO PAULO (Stone, 1942; Morgante, 1991), Pirassununga (Fernandes et al., 1993); BAHIA (Stone, 1942; Morgante, 1991), Cruz das Almas (Nascimento et al., 1983; Steck, 1991); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); AMAZONAS: Iranduba, Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); RORAIMA: Bonfin (Zucchi et al., 1996); ESPIRITU SANTO (Martins et al., 1993); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHÃO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GOIAS (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991); RONDONIA (Morgante, 1991); PARÁ (Morgante, 1991); AMAPÁ (Morgante, 1991); ACRE (Morgante, 1991).
30. <i>A. distincta</i> var. <i>minensis</i> Costa Lima, 1937	MINAS GERAIS: Viçosa (Stone, 1942)
31. <i>A. duckei</i> Costa Lima, 1934	AMAZONAS: Manaus (Stone, 1942; Zucchi et al., 1996)
32. <i>A. elegans</i> Blanchard, 1937	RIO GRANDE DO SUL: Nueva Teutonia (Stone, 1942); SAO PAULO (Stone, 1942); SANTA CATARINA (Foote, 1967)
33. <i>A. ethalea</i> (Walker), 1849	PARÁ (Greene, 1934; Stone, 1942)
34. <i>A. fenestrata</i> Lutz and Costa Lima, 1918	"AMAZONIA" (Greene, 1934; Zucchi et al., 1996)
35. <i>A. fischeri</i> Costa Lima, 1934	RIO DE JANEIRO: Fonseca, Nictheroy (sic) (Stone, 1942)
36. <i>A. flavipennis</i> Greene, 1934	PARÁ: Boa Vista (Greene, 1934; Stone, 1942) Río Tapajós (Stone, 1942)

37. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	<p>RORAIMA: (Morgante, 1991); SAO PAULO: Sao Paulo, Sao Carlos, Carapicuiba, Campinas, José Bonifacio, Ubatuba, Mogi Guassu (Morgante et al., 1980); Limeira, Cordeirópolis (Filho et al., 1987), Itaquera (Steck, 1991; Markin et al., 1996), Pirassununga (Fernandes et al., 1993), Sertaozinho (Bressan et al., 1991); MINAS GERAIS: (Morgante, 1991), Monte Verde (Morgante et al., 1980), Vicos (Greene, 1934); RIO DE JANEIRO: Sao Gonçalo (Greene, 1934), Itaguaí (Aguiar et al., 1996), Petropolis (Morgante et al., 1980); PERNAMBUCO: Recife (Morgante et al., 1980), Tabera (Greene, 1934); RIO GRANDE DO SUL: Pelotas (Salles, 1994; Lima et al., 1994); RIO GRANDE DO NORTE: Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); BAHIA: Santo Amaro (Steck, 1991), Cruz das Almas (Steck, 1991; Markin et al., 1996); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, (Zahler, 1991); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); SANTA CATARINA: (Salles, 1991, 1995; Morgante, 1991); PARANÁ: (Salles, 1991, 1995), OIRAQUARA (Schmid et al., 1988); ESPIRITU SANTO: (Martins et al., 1993); BAHIA: (Nascimento et al., 1983; Morgante, 1991), Santo Amaro da Purificação, Santo Antonio do Jesus, Porto Seguro (Morgante et al., 1980); SERGIPE: (Morgante, 1991), San Cristovao (Morgante et al., 1980); ALAGOAS: (Morgante, 1991); PARAÍBA: (Morgante, 1991); CEARÁ: (Morgante, 1991); PIAUÍ: (Morgante, 1991); MARANHAO: (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL: (Morgante, 1991); GOIÁS: (Morgante, 1991); MATO GROSSO: (Morgante, 1991); RONDONIA: (Morgante, 1991); PARÁ: (Morgante, 1991); AMAPÁ: (Morgante, 1991); AMAZONAS: (Morgante, 1991); ACRE: (Morgante, 1991).</p>
38. <i>A. fumipennis</i> Costa Lima, 1934	<p>RIO DE JANEIRO: Manguinhos (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967); Espito Santo (Norrbom, 1991); ESPIRITU SANTO: (Martins et al., 1993)</p>
39. <i>A. furcata</i> Costa Lima, 1934	<p>AMAZONAS: Manaus, Río Negro (Stone, 1942); PARÁ: Rio Cuminá (Cachoeir Paciência) (Zucchi et al., 1996)</p>
40. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	<p>RIO GRANDE DO SUL: (Greene, 1934; Norrbom, 1991); MINAS GERAIS: Vicos (Greene, 1934; Norrbom, 1991); RIO DE JANEIRO: Nilópolis (Greene, 1934; Norrbom, 1991), Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Tinguá (Norrbom, 1991); SAO PAULO: Ibuina (Morgante et al., 1980), Limeira, Cordeirópolis (Filho et al., 1987), Sto Amaro, Sao Paulo (Norrbom, 1991); Laranjal Paulista (Markin et al., 1996; Silva et al., 1996a), Sao Roque (Silva et al., 1996a); SANTA CATARINA: (Stone, 1942), Groupa (Hansa Humboldt), Nova Teutonia (Norrbom, 1991); ESPIRITU SANTO: Espírito Santo (Norrbom, 1991); GOIÁS: Anápolis, 24 km E Formoso (Norrbom, 1991); MATO GROSSO: Campo Grande, Chapada, Maracaju (Norrbom, 1991); PARANÁ: Rolândia (Caviuna) (Norrbom, 1991); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia (Zahler, 1991); BAHIA: (Morgante, 1991); SERGIPE: (Morgante, 1991); ALAGOAS: (Morgante, 1991);</p>

Brasil-5

	PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991), Massoro corresponde a un área libre de esta especie (Malavasi et al., 1994); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHÃO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); DISTRITO FEDERAL (Morgante, 1991).
41. <i>A. greenei</i> Costa Lima, 1937	BAHÍA (Stone, 1942)
42. <i>A. hamata</i> (Loew), 1873	AMAZONAS: Manaus (Greene, 1934), Río Amazonas (Foote, 1967); RORAIMA: Maracá (Zucchi et al., 1996)
43. <i>A. hambletoni</i> Costa Lima, 1934	MINAS GERAIS : Viçosa (Foote, 1967)
44. <i>A. hastata</i> Stone, 1942	AMAZONAS (Stone, 1942)
45. <i>A. integra</i> (Loew), 1873	BRASIL (Greene, 1934; Foote, 1967)
46. <i>A. kuhlmanni</i> Costa Lima, 1934	RIO DE JANEIRO: Río Trapicheiro (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967)
47. <i>A. leptozona</i> Hendel, 1914	BAHÍA: Salvador (Greene, 1934); AMAZONAS: Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); PARÁ (Zucchi et al., 1996); RORAIMA: Maracá (Zucchi et al., 1996); SAO PAULO: Monte Alto (Galli et al., 1996)
48. <i>A. longicauda</i> Costa Lima, 1934	AMAZONAS: Río Negro, Uaupés (= San Gabriel) (Foote, 1967; Zucchi et al., 1996)
49. <i>A. luderwaldti</i> Costa Lima, 1934	SAO PAULO: Ipiranga, Alto da Serra (Foote, 1967)
50. <i>A. lutzi</i> Costa Lima, 1934	RIO DE JANEIRO: Manguinhos (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967)
51. <i>A. macrura</i> Hendel, 1914	BAHÍA (Foote, 1967)
52. <i>A. manihoti</i> Costa Lima, 1934	MINAS GERAIS: Viçosa (Stone, 1942); AMAZONAS: Iranduba (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b); BAHÍA (Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHÃO (Morgante, 1991); SAO PAULO: Sertaozinho (Bressan et al., 1991)
53. <i>A. matertella</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Hernández et al., 1993)
54. <i>A. megacantha</i> Zucchi, 1984	AMAZONAS: Manaus (Ducke reserve)(Zucchi et al., 1996)
55. <i>A. minensis</i> Costa Lima, 1937	RIO DE JANEIRO (Stone, 1942 como <i>A. extensa</i>), Guanabara (Foote, 1967)

Brasil-6

56. <i>A. mixta</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Korytkowski, 1993)
57. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	MINAS GERAIS: Belo Horizonte (Stone, 1942); DISTRITO FEDERAL: Guaratiba (Stone, 1942), Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); RIO DE JANEIRO (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967); SAO PAULO: Paulínia (Morgante et al., 1996); Monte Alto (Galli et al., 1996)
58. <i>A. nascimentoi</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Hernández et al., 1993)
59. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	RIO DE JANEIRO (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967), Itaguaí (Aguiar et al., 1996); BAHIA (Nascimento et al., 1983); Cruz das Almas (Morgante et al., 1980; Steck et al., 1990), Conceição de Almeido (Steck, 1991); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); SAO PAULO: Bebedouro (Markin et al., 1996), Riberao Preto (Morgante et al., 1980; Bressan et al., 1991), Sertaozinho (Bressan et al., 1991); AMAZONAS: Iranduba, Manaus (Zucchi et al., 1996, Silva et al., 1996b); PARÁ (Zucchi et al., 1996), Belém, Quatro Bocas (Gomes et al., 1998); PERNAMBUCO: Recife (Morgante et al., 1980), Buritizeiro (Carvalho et al., 1996); MINAS GERAIS: Petrolina (Carvalho et al., 1996); RIO GRANDE DO NORTE: Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); RIO GRANDE DO SUL (Morgante, 1991); SANTA CATARINA (Morgante, 1991); PARANÁ (Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Martins et al., 1993); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GUIAS (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991); RONDÔNIA (Morgante, 1991); AMAPÁ (Morgante, 1991); RORAIMA (Morgante, 1991); ACRE (Morgante, 1991)
60. <i>A. obscura</i> Aldrich, 1925	BRASIL (Foote, 1967); "Amazon region of Brazil, Tapayos, Bt. of Stevens" (Zucchi et al., 1996)
61. <i>A. parallelia</i> (Wiedemann), 1830	BAHIA (Stone, 1942; Foote, 1967)
62. <i>A. perdita</i> Stone, 1942	BRASIL (Stone, 1942)
63. <i>A. phaeoptera</i> Costa Lima, 1937	BAHIA (Stone, 1942)
64. <i>A. pickeli</i> Costa Lima, 1934	PERNAMBUCO: Tapera (Stone, 1942; Morgante, 1991); RIO DE JANEIRO (Stone, 1942), Guanabara (Foote, 1967); DISTRITO FEDERAL: Guaratiba (Stone, 1942), Fazenda (Zahler, 1991); BAHIA (Stone, 1942), Cruz das Almas (Morgante et al., 1980; Morgante et al., 1996); "Amazônia" (Zucchi et al., 1996); AMAZONAS (Zucchi et al., 1996-D); PARÁ (Zucchi et al., 1996-D); RIO GRANDE DO NORTE: Natal (Morgante et al., 1996), Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); SAO PAULO: Paulínia (Morgante et al., 1996);

Brasil-7

	SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991).
65. <i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	SAO PAULO (Greene, 1934), Campiñas (Stone, 1942), Carapicuiba (Morgante et al., 1980), Itatiba (Stefani et al., 1996), Pirassununga (Fernandes et al., 1993), Riberao Preto, Uberlandia (Polloni et al., 1987), Serataozinho (Bressan et al., 1991); RIO DE JANEIRO (Stone, 1942; Morgante, 1991), Guanabara (Foote, 1967); MINAS GERAIS : Uberaba (Stone, 1942; Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Morgante, 1991); BAHIA (Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GOIAS (Morgante, 1991); DISTRITO FEDERAL (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991).
66. <i>A. punctata</i> Hendel, 1914	SAO PAULO (Greene, 1934); MATO GROSSO : Fazenda, Murtinho (Stone, 1942)
67. <i>A. quararibeae</i> Costa Lima, 1937	BAHIA (Stone, 1942)
68. <i>A. quiinae</i> Costa Lima, 1937	BAHIA (Stone, 1942); DISTRITO FEDERAL : Fazenda (Zahler, 1991); SAO PAULO : Pirassununga (Fernandes et al., 1993)
69. <i>A. reichardti</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Korytkowski, 1993)
70. <i>A. rheediae</i> Stone, 1942	BRASIL (Hernández et al., 1993); MATO GROSSO DO SUL : Brazilandia (Morgante et al., 1980)
71. <i>A. robusta</i> Greene, 1934	PARÁ : Río Cuminá (Stone, 1942; Zucchi et al., 1996-D)
72. <i>A. sagittifera</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Hernández et al., 1993)
73. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	BAHIA (Greene, 1934; Morgante, 1991), Santo Antonio do Jesus (Morgante et al., 1980); SAO PAULO (Stone, 1942, Morgante, 1991)), Sao Sebastiao (Steck et al., 1990) ; DISTRITO FEDERAL : Brasilia (Stone, 1942), Nova Betânia (Zahler, 1991); AMAZONAS : Manaus (Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b), "Amazônia" (Zucchi et al., 1996); PARÁ : Santa Isabel do Pará (Zucchi et al., 1996); RORAIMA : Maracá (Zucchi et al., 1996); RIO GRANDE DO SUL (Morgante, 1991); SANTA CATARINA (Morgante, 1991); PARANÁ (Morgante, 1991), PIRAQUARA (Schmid et al., 1988); MINAS GERAIS (Morgante, 1991); RIO DE JANEIRO (Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Morgante, 1991, Martins et al., 1993); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ

	(Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991); RONDONIA (Morgante, 1991); AMAPÁ (Morgante, 1991); ACRE (Morgante, 1991).
74. <i>A. shannoni</i> Stone, 1942	AMAZONAS: Río Purus, Huitanaá (Norrbom, 1991)
75. <i>A. similis</i> Greene, 1934	PERNAMBUCO: Bonito (Greene, 1934)
76. <i>A. simulans</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Hernández et al., 1993)
77. <i>A. sinvali</i> Zucchi, 1982	SANTA CATARINA: Caçador (Zucchi, 1982)
78. <i>A. sodalis</i> Stone, 1942	PARÁ: Santarém (Stone, 1942)
79. <i>A. sororcula</i> Zucchi, 1979	DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); BAHIA (Nascimento et al., 1983; Morgante, 1991), Nova Soure (Markin et al., 1996); RIO DE JANEIRO: Itaguaí (Aguiar et al., 1996); RIO GRANDE DO NORTE: Mossoro, Assu (Nascimento et al., 1993); SAO PAULO: Pirassununga (Fernandes et al., 1993), Rieraó Preto, Sertaozinho, Bebedouro, Santo Antonio de Alegria (Bressan et al., 1991); MINAS GERAIS (Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PERNAMBUCO (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GOIAS (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991)
80. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	AMAZONAS: Manaos (Stone, 1942; Zucchi et al., 1996; Silva et al., 1996b), Iranduba (Zucchi et al., 1996); PARÁ: Belém (Morgante et al., 1980; Zucchi et al., 1996, Gomes et al., 1998), Quatro Bocas (Gomes et al., 1998); RORAIMA: Pacaraima (Zucchi et al., 1996); RONDONIA (Morgante, 1991); AMAPÁ (Morgante, 1991); ACRE (Morgante, 1991)
81. <i>A. submunda</i> Costa Lima, 1937	BAHIA (Stone, 1942)
82. <i>A. tenella</i> Zucchi, 1979	BRASIL (Hernández et al., 1993)
83. <i>A. townsendi</i> Greene, 1934	PARÁ: Boa Vista, Río Tapajós (Greene, 1934)
84. <i>A. undosa</i> Stone, 1942	MATO GROSSO: Piedra Blanca, Corumbá (Foote, 1967)
85. <i>A. xanthochaeta</i> Hendel, 1914	RIO GRANDE DO SUL (Greene, 1934); SAO PAULO: Ibuina (Morgante et al., 1980)
86. <i>A. zenildae</i> Zucchi, 1979	SAO PAULO: Riberao Preto (Bressan et al., 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Araujo, 1996)
87. <i>A. zernyi</i> Costa Lima, 1934	MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães (Foote, 1967)

Brasil-9

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock, 1994	AMAPÁ: Oiapoque (Informes del Ministerio de Agricultura de Brasil, 1996)

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	CEARA: Fortaleza (Morgante, 1991); PERNAMBUCO: Petrolina (Morgante, 1991); BAHIA: Juazeiro (Morgante, 1991); DISTRITO FEDERAL: Nova Betânia, Fazenda (Zahler, 1991); RIO DE JANEIRO: Itaguaí (Aguiar et al., 1996); SAO PAULO: Pirassununga (Fernandes et al., 1993), Limeira, Cordeirópolis (Filho et al., 1987), Riberao Preto, Sertaozinho (Bressan et al., 1991); RIO GRANDE DO SUL (Morgante, 1991); SANTA CATARINA (Morgante, 1991); PARANÁ (Santos, 1988, Morgante, 1991); MINAS GERAIS (Rossi et al., 1988, Morgante, 1991); ESPIRITU SANTO (Martins et al., 1993, Morgante, 1991); SERGIPE (Morgante, 1991); ALAGOAS (Morgante, 1991); PARAÍBA (Morgante, 1991); RIO GRANDE DO NORTE (Morgante, 1991); CEARÁ (Morgante, 1991); PIAUÍ (Morgante, 1991); MARANHAO (Morgante, 1991); MATO GROSSO DO SUL (Morgante, 1991); GOIÁS (Morgante, 1991); MATO GROSSO (Morgante, 1991); PARA: Belem, Quatro Bocas (Gomes et al., 1998).

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. adusta</i> Foote, 1981	SAO PAULO: Cantareira, Chapadao (Foote, 1981)
2. <i>R. blanchardi</i> (Aczél), 1954	SANTA CATARINA (Fenilli, 1993)
3. <i>R. ferruginea</i> Hendel, 1927	RIO GRANDE DO SUL: Santa Cruz, Nueva Teutonia (Foote, 1981), Pedras Altas (Foote, 1967); PARANÁ: Mandirituba (Foote, 1981)
4. <i>R. macquartii</i> (Loew), 1873	GOIAS: Goias (Foote, 1981); MINAS GERAIS: Ouro Preto (Foote, 1981)
4.1 <i>R. achraspis</i> (Wied.), 1830	<i>Nomen dubium</i> (Foote, 1981)

Especies del género **Toxotrypana**, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker, 1860	BRASIL (Foote, 1967)

3.4 COLOMBIA

Colombia-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. anomala</i> Stone, 1942	COLOMBIA (Korytkowski, 1993)
2. <i>A. bahiensis</i> Costa Lima, 1937	CUNDINAMARCA: Anolaima, Anapoima, Pacho (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); CAQUETÁ: El Doncello (Núñez, 1981); CALDAS: Chinchiná (Núñez, 1981); BOYACÁ: San Eduardo (Núñez, 1981)
3. <i>A. coronilli</i> Carrejo y G., 1993	COLOMBIA (Hernández et al., 1993)
4. <i>A. curitis</i> Stone, 1942	COLOMBIA (Bernal, 1996)
5. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	COLOMBIA (Stone, 1942); CUNDINAMARCA: Anolaima, Anapoima, Fusagasugá, Tensa, Tibacuy (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); CALDAS: Palestina (Núñez, 1981); BOYACÁ: San Eduardo (Núñez, 1981)
6. <i>A. fraterculus</i> (Wiedemann) 1830	COLOMBIA: Nueva Granada (Stone, 1942); La Esperanza (CIE, 1958a); CUNDINAMARCA: Anolaima, Anapoima, Fusagasugá, Guayabetal, Junín, La Mesa, La Vega, Pacho, Tensa, Viotá (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta, Ragonvalia, Tibú (Núñez, 1981); CALDAS: Chinchiná, Palestina (Núñez, 1981); BOYACÁ: Garagoa, Guateque, San Eduardo (Núñez, 1981); ANTIOQUIA (Arévalo, 1997); Bello, Girardota, Sopetrán (Núñez, 1981); NARIÑO: Consacá, La Unión (Núñez, 1981); GUAJIRA: Fonseca (Nuñez, 1981); META: Granada, Villavicencio (Núñez, 1981); SANTANDER: Guavatá, Lebrija, Soatá, Vélez (Núñez, 1981); VALLE: Palmira (Nuñez, 1981); CAUCA: Santander del Sur (Arévalo, 1997); VALLE DEL CAUCA: (Arévalo, 1997).
7. <i>A. grandicula</i> Norrbom, 1991	AMAZONAS: Río Putumayo, Puerto Arica (Norrbom, 1991)
8. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	COLOMBIA: Nueva Granada (Stone, 1942); ANTIOQUIA: Santa Bárbara (Norrbom, 1991); BOYACÁ: Muzo (Norrbom, 1991); CAUCA: Santander (Norrbom, 1991); SANTANDER: Bucaramanga (Norrbom, 1991); VALLE: Florida (Norrbom, 1991)
9. <i>A. leptozena</i> Hendel, 1914	CAQUETÁ: El Doncello (Núñez, 1981)
10. <i>A. possible limae</i> Stone, 1942	COLOMBIA: (Arévalo, 1997)
11. <i>A. ludens</i> (Loew), 1873	CUNDINAMARCA: Cachipay (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); SANTANDER: Lebrija (Núñez, 1981)

Colombia-2

12. <i>A. manihoti</i> Lima, 1934	COLOMBIA (Korytkowski, 1993); VALLE DEL CAUCA: (Arévalo, 1997)
13. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	COLOMBIA (Korytkowski, 1993)
14. <i>A. mucronata</i> Stone, 1942	COLOMBIA (Korytkowski, 1993)
15. <i>A. nunezae</i> Steyskal, 1977	CUNDINAMARCA: Cachipay (Steyskal, 1977a), Anolaima, Anapoima, La Vega, San Francisco (Núñez, 1981); CALDAS: Palestina (Núñez, 1981); SANTANDER: San Vicente (Nuñez, 1981)
16. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	CUNDINAMARCA: Anolaima, Anapoima, (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); CAQUETÁ: El Doncello (Núñez, 1981); ANTIOQUIA: Bello, Chigorodó, Santa Fé de Antioquia (Núñez, 1981); TOLIMA: El Espinal (Núñez, 1981); SANTANDER: Vélez (Núñez, 1981); VALLE: Palmira (Nuñez, 1981)
17. <i>A. ornata</i> Aldrich, 1925	ANTIOQUIA: (Arévalo, 1997)
18. <i>A. pallidipennis</i> Greene, 1934	ANTIOQUIA: Medellín (Greene, 1934, Stone, 1942); CUNDINAMARCA: Anapoima, Fusagasugá (Núñez, 1981); QUINDÍO: Armenia (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); VALLE DEL CAUCA (Arévalo, 1997); HUILA: Valle de Huila (Arévalo, 1997)
19. <i>A. pickeli</i> Lima, 1934	BOYACÁ: Santa María (Núñez, 1981); VALLE DEL CAUCA: (Arévalo, 1997)
20. <i>A. rheediae</i> Stone, 1942	CUNDINAMARCA: Anolaima (Núñez, 1981); META: Villavicencio (Núñez, 1981)
21. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	CAQUETÁ: El Doncello (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta (Núñez, 1981); ANTIOQUIA: Santa Fe de Antioquia (Núñez, 1981); GUAJIRA: Fonseca (Nuñez, 1981); SANTANDER: San Gil (Núñez, 1981); VALLE: Palmira (Nuñez, 1981)
22. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	CUNDINAMARCA: Anolaima, Anapoima, Bituima, Fusagasugá, La Mesa, La Vega, Tensa, Viotá (Núñez, 1981); NORTE DE SANTANDER: Cúcuta, Ragonvalia (Núñez, 1981); BOYACÁ: Garagoa (Núñez, 1981); ANTIOQUIA (Arévalo, 1997): Bello, Girardota (Núñez, 1981); META: Acacias, Granada, Villavicencio (Núñez, 1981); SANTANDER: Soatá, Vélez (Núñez, 1981); VALLE: Palmira (Nuñez, 1981); TOLIMA: El Espinal (Núñez, 1981); HUILA: Gigante (Nuñez, 1981); MAGDALENA: Santa Marta (Núñez, 1981); <u>VALLE DEL CAUCA</u> : (Arévalo, 1997)

Colombia-3

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Colombia	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824 COLOMBIA (Foote, 1980; CIE, 1984); NARIÑO (Arévalo, 1997); ANTIOQUIA: (Arévalo, 1997), Medellín, Bello, Copacabana (Arévalo, 1997); MAGDALENA (Arévalo, 1997); CESAR: (Arévalo, 1997); LA GUAJIRA: (Arévalo, 1997); ATLÁNTICO: (Arévalo, 1997); CAUCA: (Arévalo, 1997); AMAZONAS: San Cristóbal (Arévalo, 1997).	

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), 1867 COLOMBIA (Bush, 1966-D); ANTIOQUIA: Bailecito, cerca de Medellín (Foote, 1981-D)	

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>T. curvicauda</i> Gerstaecker, 1860 CUNDINAMARCA: Anapoima, (Núñez, 1981); CALDAS: Palestina (Núñez, 1981); ANTIOQUIA (Arévalo, 1997): Sopetrán (Núñez, 1981); SANTANDER: San Gil (Núñez, 1981); QUINDÍO: Armenia (Nuñez, 1981); TOLIMA: Honda (Núñez, 1981); VALLE DEL CAUCA: (Arévalo, 1997); MAGDALENA (Arévalo, 1997).	

3.5 CHILE⁽¹⁾

Chile-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	Especie erradicada de Chile en 1964 (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996). Localidades donde se detectó: I REGIÓN ARICA: Ciudad de Arica (Greene, 1934), Valle de Azapa (Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977), Codpa, Tignamar (Herrera, 1977), Las Maitas (Valle de Azapa) (Greene, 1934); IQUIQUE: Miñe-Miñe, Cutijmalla (Herrera, 1967; Olalquiaga et al., 1993)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt),	Especie erradicada de la Isla de Pascua, Chile está libre de especies de este género (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996). Localidad donde se detectó y erradicó: V REGIÓN: Isla de Pascua (Batema et al., 1973; FAO, 1977; Herrera, 1977; Lobos, 1993; Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996)

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	Chile se encuentra libre de esta especie desde diciembre de 1995, al erradicarse de la provincia de Arica, I Región (IICA, 1996b). En las siguientes localidades se detectó y erradicó: I REGIÓN: ARICA: Ciudad de Arica (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996; Herrera, 1977; IICA, 1996b); Azapa (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996; Herrera, 1977); Codpa, Chaca (Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977); Chacalluta, Central, Gallinazos, Bellet, Hipódromo, Parque Puerta Norte (Olalquiaga et al., 1993; Harris et al., 1991), Cuya (Olalquiaga et al., 1993); IQUIQUE: Ciudad de Iquique (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996; Herrera, 1977; Harris et al., 1993), Pica (Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977; Harris et al., 1993), Chiza, Matilla, Esmeralda, Suca, Canchones (Olalquiaga et al., 1993); II REGIÓN: ANTOFAGASTA: Ciudad de Antofagasta (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996; Herrera, 1977),

(1) Con ocasión de las Reuniones XXIII (Salvador, Brasil) y XXV (Asunción, Paraguay) del Consejo Directivo del COSAVE, los miembros del mismo, al considerar la presente publicación como si fuera un listado de plagas cuarentenarias – que no lo es, ni ha pretendido serlo – manifestaron algunas inquietudes en relación con los listados de especies de Moscas de las Frutas reportados en la bibliografía internacional para los cinco países del Cono Sur, plantearon su deseo de que pudieran ser modificados en función de los Listados A1 y A2 de Plagas Cuarentenarias del COSAVE, y ratificaron la vigencia de estos últimos Listados mediante Resolución No. 144-23/98D, con el reconocimiento de ellos “como el único documento referencial de esta materia y como instrumento básico de negociación en el intercambio comercial de productos agrícolas”.

Chile-2

	Tocopilla (Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977), Taltal (Olalquiaga et al., 1993), EL LOA: Calama (Olalquiaga et al., 1993); III REGIÓN: CHAÑARAL: Diego de Alamagro (ex Pueblo Hundido)(Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977), Lianta, El Salvador (Olalquiaga et al., 1993), HUASCO: Vallenar (Olalquiaga et al., 1993); IV REGIÓN: ELQUI: La Serena (Olalquiaga et al., 1993; Herrera, 1977), Coquimbo (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996); V REGIÓN: LOS ANDES: Los Andes (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996), VALPARAÍSO: Viña del Mar (Olalquiaga et al., 1993); REGIÓN METROPOLITANA: SANTIAGO: Ciudad de Santiago (Olalquiaga et al., 1993; Lobos, 1996; Herrera, 1977; NAPPO, 1994b)
--	--

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. conversa</i> (Brèthes), 1919	IV REGIÓN: ELQUI: Coquimbo (Frías, 1989), CHOAPA: Canela Baja (Foote, 1981); V REGIÓN: QUILLOTA: La Cruz, VALPARAÍSO: Cón-Cón (Foote, 1981), SAN ANTONIO: Algarrobo (Frías, 1989, 1992), SAN FELIPE DE ACONCAGUA: Putaendo, LOS ANDES: San Esteban, Campos de Ahumada, Río Blanco, Guardia Vieja (Foote, 1981); REGIÓN METROPOLITANA: SANTIAGO: Pudahuel, La Florida, (Frías, 1989), Quebrada de la Plata, cerca de Maipú (Foote, 1981), Las Vizcachas (Frías et al., 1984, 1989), CORDILLERA: Las Vertientes (Frías, 1989), Pirque (Frías, 1992), CHACABUCO: Colina (Frías, 1989); VII REGIÓN: CURICÓ: Fundo La Montaña, Estero La Palma, del Río Teno, a 6 km E Los Queñes (Foote, 1981); IX REGIÓN: MALLECO: Río Blanco (Foote, 1981), CAUTÍN: Pucón (Frías, 1989); X REGIÓN: VALDIVIA: Valdivia (Frías, 1989)
2. <i>R. nova</i> (Schiner), 1868	III REGIÓN (Prado, 1991); IV REGIÓN: ELQUI: Coquimbo (Frías, 1986); V REGIÓN: LOS ANDES; SAN FELIPE DE ACONCAGUA: Putaendo; VALPARAÍSO: Cón-Cón, Portezuelo, QUILLOTA: La Cruz (Foote, 1981), Hijuelas, Pachacama (Frías, 1986) ; REGIÓN METROPOLITANA: SANTIAGO: Quebrada de la Plata, Rinconada de Maipú (Foote, 1981); VI REGIÓN: COLCHAGUA: Santa Cruz (Foote, 1981); VII REGIÓN: CURICÓ: Estero La Palma, a 6 km al E de Los Queñes; VIII REGIÓN: ÑUBLE: Noguache (Foote, 1981); IX REGIÓN: MALLECO: Curacautín, Angol, CAUTÍN: 10 mi NE Pucón, Salto del Pilmaiquén (Foote, 1981); X REGIÓN: OSORNO: Pucatrihue, 20 km E Puyehue, LLANQUIHUE: Casa Pangue, ANCUD (Foote, 1981); XI REGIÓN: AISÉN: Puerto Cisnes (Foote, 1981)
3. <i>R. penela</i> Foote, 1981	VIII REGIÓN: ARAUCO: Pichinahuel (Foote, 1981)

Chile-3

4. <i>R. tomatis</i> Foote, 1981	II REGIÓN: Antofagasta (Foote, 1981, Frías et al, 1991, 1993); III REGIÓN: Copiapó (Foote, 1981); IV REGIÓN: ELQUI: Vicuña (Foote, 1981); V REGIÓN: La Cruz, Valparaíso (Foote, 1981). Frías (1991, 1993), ha realizado prospecciones entre la III a VII Regiones de Chile en busca de esta especie, detectándola solamente en la II Región (Antofagasta).
---	--

Especies del género **Toxotrypana**, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Chile (Olalquiaga et al, 1993, Lobos, 1996).	

3.6 ECUADOR

Ecuador-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. atrox</i> Aldrich, 1925	TUNGURAHUA (Molineros et al., 1992); AZUAY (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); CHIMBORAZO (Molineros et al., 1992)
2. <i>A. bahiensis</i> , Costa Lima, 1937	PASTAZA (Molineros et al., 1992)
3. <i>A. chilayae</i> Greene, 1934	LOJA (Molineros et al., 1992); MANABÍ (Molineros et al., 1992)
4. <i>A. concava</i> Greene, 1934	LOS RÍOS (Molineros et al., 1992)
5. <i>A. crebra</i> Stone, 1942	NAPO (Molineros et al., 1992)
6. <i>A. cryptostrepha</i> Hendel, 1914	NAPO (Molineros et al., 1992); SUCUMBÍOS (Molineros et al., 1992)
7. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	CARCHI (Molineros et al., 1992); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); IMBABURA (Molineros et al., 1992); SUCUMBÍOS (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PICHINCHA (Molineros et al., 1992); MANABÍ (Molineros et al., 1992); GUAYAS (Molineros et al., 1992); EL ORO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); ZAMORA CHINCHIPÉ (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992); AZUAY (Molineros et al., 1992); CAÑAR (Molineros et al., 1992); CHIMBORAZO (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992); BOLIVAR (Molineros et al., 1992); TUNGURAHUA (Molineros et al., 1992).
8. <i>A. dryas</i> Stone, 1942	AZUAY (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992)
9. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	CARCHI (Molineros et al., 1992); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); IMBABURA (Molineros et al., 1992); SUCUMBÍOS (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PICHINCHA (Molineros et al., 1992); MANABÍ (Molineros et al., 1992); GUAYAS (Molineros et al., 1992); EL ORO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); ZAMORA CHINCHIPÉ (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992); AZUAY (Molineros et al., 1992); CAÑAR (Molineros et al., 1992); CHIMBORAZO (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992); BOLIVAR (Molineros et al., 1992); TUNGURAHUA (Molineros et al., 1992). Puerto Inca ? (Cabanilla et al., 1993)

Ecuador-2

10. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	LOJA: Mal.acatos (Norrbom, 1991); AZUAY (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992).
11. <i>A. greenei</i> Costa Lima, 1937	NAPO (Molineros et al., 1992); SUCUMBÍOS (Molineros et al., 1992).
12. <i>A. leptozona</i> Hendel, 1914	ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); PICHINCHA (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992). Ventanas (Cabanilla et al., 1993)
13. <i>A. manihoti</i> Costa Lima, 1934	EL ORO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PICHINCHA (Molineros et al., 1992).
14. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	NAPO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992).
15. <i>A. mucronata</i> Stone, 1942	CARCHI (Molineros et al., 1992); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); MORA SANTIAGO (Molineros et al., 1992).
16. <i>A. nigripalpis</i> Hendel, 1914	EL ORO (Molineros et al., 1992).
17. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	CARCHI (Molineros et al., 1992); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); IMBABURA (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PICHINCHA (Molineros et al., 1992); GUAYAS (Molineros et al., 1992); EL ORO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); ZAMORA CHINCHIPÉ (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992); CAÑAR (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992); BOLIVAR (Molineros et al., 1992); COTOPAXI (Molineros et al., 1992). Balzar ? (Cabanilla et al., 1993)
18. <i>A. ornata</i> Aldrich, 1925	TUNGURAHUA: Baños (Greene, 1934), Ambato (Molineros et al., 1992); AZUAY; PICHINCHA (Molineros et al., 1992).
19. <i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	BOLIVAR (Molineros et al., 1992); COTOPAXI (Molineros et al., 1992).
20. <i>A. rheediae</i> Stone, 1942	AZUAY (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992).
21. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	ECUADOR: Baños (Greene, 1934); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); MANABÍ (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); ZAMORA CHINCHIPÉ (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); AZUAY (Molineros et al., 1992); CHIMBORAZO (Molineros et al., 1992); BOLIVAR (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992); COTOPAXI (Molineros et al., 1992);

Ecuador-3

	PICHINCHA (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992). Taura ?, Balzar (Cabanilla et al., 1993)
22. <i>A. sororcula</i> Zucchi,	LOJA (Molineros et al., 1992).
23. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	CARCHI (Molineros et al., 1992); ESMERALDAS (Molineros et al., 1992); IMBABURA (Molineros et al., 1992); SUCUMBIOS (Molineros et al., 1992); NAPO (Molineros et al., 1992); PI-CHINCHA (Molineros et al., 1992); MANABÍ (Molineros et al., 1992); GUAYAS (Molineros et al., 1992); EL ORO (Molineros et al., 1992); LOJA (Molineros et al., 1992); ZAMORA CHIN-CHIPÉ (Molineros et al., 1992); MORONA SANTIAGO (Molineros et al., 1992); PASTAZA (Molineros et al., 1992); AZUAY (Molineros et al., 1992); CAÑAR (Molineros et al., 1992); CHIMBORAZO (Molineros et al., 1992); LOS RÍOS (Molineros et al., 1992); BOLIVAR (Molineros et al., 1992); TUNGURAHUA (Molineros et al., 1992)
24. <i>A. tecta</i> Zucchi, 1979	LOJA (Molineros et al., 1992)
25. <i>A. townsendi</i> Greene, 1934	NAPO (Molineros et al., 1992); SUCUMBIOS (Molineros et al., 1992)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Ecuador.	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	ECUADOR (Foote, 1980); CARCHI : Mira, Chota (Molineros et al., 1992); IMBABURA : Ibarra (Molineros et al., 1992); PICHINCHA : Perúcho, Puéllaro, Guayllabamba (Molineros et al., 1992); EL ORO : Machala, Arenillas, Zaruma, Portovelo (Molineros et al., 1992); LOJA : Loja, Catamayo, El Tambo, Malcacatos, Vilcabamba (Molineros et al., 1992); AZUAY : Paute, Gualaceo, Santa Isabel (Molineros et al., 1992); BOLIVAR : Las Naves (Molineros et al., 1992); TUNGURAHUA : Baños, Patate (Molineros et al., 1992).

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. rhytidia</i> Hendel, 1914	IMBABURA : Ibarra (Foote, 1981)

Ecuador-4

Especies del género **Toxotrypana**, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Toxotrypana sp cr curvicauda, n. sp.</i>	LOJA (Molineros et al., 1992)

3.7 GUAYANA FRANCESA

Guayana Francesa-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	GUAYANA FRANCESA (Rohwer, 1992)

Especies del género *Bactrocera* por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock, 1994	GUAYANA FRANCESA (Rohwer, 1992; White et al, 1992); CAYENA (Drew & Hamcock, 1994)

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guayana Francesa (Foote, 1980).	

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guayana Francesa.	

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guayana Francesa.	

3.8 GUYANA (EX-GUYANA BRITANICA)

Guyana (Ex-Guyana Británica)-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. atrigona</i> Hendel, 1914	GUYANA: Demarara (Norrbom, 1991)
2. <i>A. barnesi</i> Aldrich, 1926	GUYANA: Morabeli Creek, Essequibo River (Stone, 1942)
3. <i>A. consobrina</i> (Loew), 1873	GUYANA (Foote, 1967)
4. <i>A. convoluta</i> Stone, 1942	GUYANA: Morabelli Creek, Essequibo River (Stone, 1942); BARTICA: Kartabo (Stone, 1942); NORTH WEST: Issororo (Stone, 1942).
5. <i>A. dissimilis</i> Stone, 1942	GUYANA: Tumatumari (Stone, 1942)
6. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	GUYANA (Stone, 1942)
7. <i>A. fractura</i> Stone, 1942	GUYANA: Kutari Sourses (Stone, 1942)
8. <i>A. fraterculus</i> (Wiedemann), 1830	GUYANA (Foote, 1967, Rohwer, 1992); King Frederik IV Falls (CIE, 1958a)
9. <i>A. guianae</i> Stone, 1942	BARTICA: Kartabo (Foote, 1967)
10. <i>A. integra</i> (Loew), 1873	GUYANA (Foote, 1967-D)
11. <i>A. leptozona</i> Hendel, 1914	GUYANA (Stone, 1942)
12. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	GUYANA (Foote, 1967, Rohwer, 1992)
13. <i>A. parallela</i> Wiedemann, 1830	GUYANA (Foote, 1967-D)
14. <i>A. parishii</i> Stone, 1942	BARTICA (Foote, 1967)
15. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	GUYANA (Foote, 1967, Rohwer, 1992)
16. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	GUYANA (Stone, 1942)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock, 1994	REGION 6: Siparuta (NAPPO, 1994 a); Orealla (IICA, 1996a)

Guyana (Ex-Guyana Británica)-2

Especies del género **Ceratitis**, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guyana (Foote, 1980).	

Especies del género **Rhagoletis**, por orden alfabético.

Especies	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guyana.	

Especies del género **Toxotrypana**, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Guyana.	

3.9 PARAGUAY⁽¹⁾

Paraguay-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. daciformis</i> Bezz, 1909	PARAGUAY (Hernández et al., 1993)
2. <i>A. elegans</i> Blanchard, 1937	PARAGUAY: San Bernardino (Stone, 1942)
3. <i>A. fraterculus</i> (Wiedemann), 1830	PARAGUAY (Stone, 1942; Rohwer, 1992; Hernández et al., 1993)
4. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	PARAGUAY: San Bernardino (Green, 1934); PARAGUAY (Rohwer, 1992); ALTO PARANÁ: Hohenau, Bella Vista (Norrbom, 1991); CONCEPCIÓN: Horqueta (Norrbom, 1991); GUAIRA: Villarrica (Norrbom, 1991); LA CORDILLERA: San Bernardino (Norrbom, 1991)
5. <i>A. macrura</i> Hendel, 1914	PARAGUAY (Greene, 1934), San Bernardino (Foote, 1967)
6. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	PARAGUAY: San Bernardino (Stone, 1942)
7. <i>A. parallelia</i> (Wiedemann), 1930	PARAGUAY (Stone, 1942-D), San Bernardino (Greene, 1934)
8. <i>A. punctata</i> Hendel, 1914	PARAGUAY: San Bernardino (Greene, 1934)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Paraguay.	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	PARAGUAY (CIE, 1967, 1984)

(1) Con ocasión de las Reuniones XXIII (Salvador, Brasil) y XXV (Asunción, Paraguay) del Consejo Directivo del COSAVE, los miembros del mismo, al considerar la presente publicación como si fuera un listado de plagas cuarentenarias – que no lo es, ni ha pretendido serlo – manifestaron algunas inquietudes en relación con los listados de especies de Moscas de las Frutas reportados en la bibliografía internacional para los cinco países del Cono Sur, plantearon su deseo de que pudieran ser modificados en función de los Listados A1 y A2 de Plagas Cuarentenarias del COSAVE, y ratificaron la vigencia de estos últimos Listados mediante Resolución No. 144-23/98D, con el reconocimiento de ellos “como el único documento referencial de esta materia y como instrumento básico de negociación en el intercambio comercial de productos agrícolas”.

Paraguay-2

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especies	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Paraguay.	

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Paraguay.	

3.10 PERÚ

Perú-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. antunesi</i> Costa Lima, 1938	TUMBES: CONTRALMIRANTE VILLAR: Zapotal, Cañaveral (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽¹⁾
2. <i>A. atrox</i> Aldrich, 1925	LAMBAYEQUE: CHICLAYO: Carnique Bajo (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Torgopampa, Pasamayo, Ajípampa, Anchanchón (Korytkowski y Ojeda, 1969); LIMA: La Molina (Steyskal, 1977a)
3. <i>A. bahiensis</i> Costa Lima, 1937	LAMBAYAQUE: CHICLAYO: Carnique Bajo (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Anchancón (Korytkowski y Ojeda, 1969)
4. <i>A. barbiellinii</i> Costa Lima, 1938	CAJAMARCA: CHOTA: Ajípampa; SANTA CRUZ: El Espinal (Korytkowski y Ojeda, 1969)
5. <i>A. bezzii</i> Costa Lima, 1934	CAJAMARCA: CHOTA: Torgopampa, Lurifico (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽²⁾
6. <i>A. bistrigata</i> Bezzi, 1919	TUMBES: TUMBES: La Florida (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Carrizal, Potrillos, Lisco (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽³⁾
7. <i>A. chichayae</i> Greene, 1934	PIURA: SULLANA: Marcavelica, Querecotillo; MORROPON: Chulucanas, Malingas (Korytkowski y Ojeda, 1969); LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Las Norias, Jayanca; FERREÑAFE: Patapo; CHICLAYO (Greene, 1934), Hda. Quefe (Stone, 1942), Monsefú, Tulipe, Cuculí (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Cochabamba (Korytkowski y Ojeda, 1969)
8. <i>A. concava</i> Greene, 1934	PERÚ (Hernández et al., 1993)
9. <i>A. cryptostrepha</i> Hendel, 1914	CUSCO (MASHAGUA): Río Urubamba (Greene, 1934; Korytkowski y Ojeda, 1968)
10. <i>A. daciformis</i> Bezzi, 1909	PERÚ (White y Elson - Harris, 1992)
11. <i>A. dissimilis</i> Stone, 1942	PIURA: Huancabamba (Canchaque, Km 33 Olmos - Río Marañon) (Korytkowski y Ojeda, 1969); LAMBAYEQUE: CHICLAYO: Monsefú, Bocatoma (Korytkowski y Ojeda, 1969);

(1) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. obliqua*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

(2) y (3) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) estos registros corresponderían a identificaciones realizadas con "Material de Brasil". No se dispone de las respectivas publicaciones oficiales de confirmación.

Perú-2

	CAJAMARCA: CHOTA: Poterillo, Lisco, Torgopamapa (Korytkowski y Ojeda, 1969)
12. <i>A. distans</i> Hendel, 1914	CUSCO (MASHAGUA): Santa Eulalia (Greene, 1934), Río Urubamba (Stone, 1942; Korytkowski y Ojeda, 1968)
13. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	PIURA: SULLANA: Marcavelica, Querecotillo; PAITA: Amotape; MORROPON: Chulucanas, Salitral, Malingas (Korytkowski y Ojeda, 1969); LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE (Greene, 1934), Motupe, Jayanca, Mochumí (Korytkowski y Ojeda, 1969); CHICLAYO: (Greene, 1934), Monsefú, Pucalá, Tulipe, Cuvulí, Bocatoma, Ucupe (Korytkowski y Ojeda, 1969), FERREÑAFR (Green, 1934); CAJAMARCA: CHOTA: Carhuaquero, Carrizal, Potrerill, Lisco, Torgopampa, Cochabamba; SANTA CRUZ: El Espinal; CUTUMAZA: Tembladera (Korytkowski y Ojeda, 1969); HUÁNUCO: Valle del Huánuco (Cuculiza et al., 1975) .
15. <i>A. flavissima</i> Hering, 1940	SAN MARTÍN: Río Guallanga, Juamjuí (Foote, 1967)
16. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	TUMBES: ZURUMILLA: Matapalo; TUMBES: Pampa de Hospital, La Florida, Río Seco; CONTRALMIRANTE VILLAR: Cañaveral, Gramadal (Korytkowski y Ojeda, 1969); PIURA: SULLANA (Greene, 1934) Marcavelica, Querecotillo; PAITA: Amotape; PIURA: Catacaos; MORROPON: Chulucanas, Salitral, Malingas, Pachas; HUNCABAMBA: Canchaque (Korytkowski y Ojeda, 1969) ; LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Las Marías, Motupe, Jayanca, Tucumé, Mochumí, Lambayeque; FERREÑAFE: Patapo, Ferreñafe; CHICLAYO: Monsefú, Pucalá, Tulipe, Cuculí, Bocatoma, Ucupe, Cayaltí, Chumbenique, Carnique Bajo (Korytkowski y Ojeda, 1969) ; CAJAMARCA: JAEN: Pucará, El "81", Pomahuaca, La Perla; SAN IGNACIO: Limón; CHOTA: Carhuaquero, Carrizal, Poterrillo, Lisco, Torgopampa, Lurifico, Cochabamba, Peña de los Loros, Pasamayo, Ajipampa, Anchanchón; SANTA CRUZ: El Espinal; CONTUMAZA: Tembladera, Chilete (Korytkowski y Ojeda, 1969); LA LIBERTAD: TRUJILLO (Greene, 1934), PASCAMAYO: Chepén (Korytkowski y Ojeda, 1969); AMAZONAS: BAGUA: Bagua, Aramango (Korytkowski y Ojeda, 1969); HUANUCO: Valle del Huanuco (Cuculiza et al., 1975); ICA: Valle de Ica (Jara, 1971); LIMA: Chillón (Jara, 1971), Chosica, Sagarcia (Green, 1934).
17. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	AMAZONAS: Chimbotes (Greene, 1934); LAMBAYEQUE: CHICLAYO: Tulipe (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: JAEN: El Recodo; SAN IGNACIO: Limón; CHOTA: Carrizal, Torgopampa, Pasamayo (Korytkowski y Ojeda, 1969); CUSCO: Quillabamba, Mishagua - Urubamba (unión de ríos) (Norrbom, 1991)
18. <i>A. hermosa</i> Norrbom y Kim, 1988	PERÚ: Pichis, puerto Yessup (Norrbom et al., 1988b)

19. <i>A. lambayacae</i> Korytkowski y Ojeda, 1968	LAMBAYEQUE: CHICLAYO: Chumbenique (Korytkowski y Ojeda, 1969)
20. <i>A. lambda</i> Hendel, 1914	PERÚ: Pini - Pini (Greene, 1934, Korytkowski y Ojeda, 1968)
21. <i>A. lanceola</i> Stone, 1942	TUMBES: TUMBES: Río Seco (Korytkowski y Ojeda, 1969); PIURA: MORROPON: Pachas (Korytkowski y Ojeda, 1969); LAMBAYEQUE: CHICLAYO: Carnique Bajo (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Carhuaquero, Pasamayo (Korytkowski y Ojeda, 1969)
22. <i>A. leptozona</i> Hendel, 1914	PERÚ (Couturier et al., 1993)
23. <i>A. ludens</i> (Loew), 1873	LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Jayanca (Korytkowski y Ojeda, 1968) ⁽¹⁾
24. <i>A. manihoti</i> Costa Lima, 1934	CAJAMARCA: CHOTA: Cochabamba (Korytkowski y Ojeda, 1969)
25. <i>A. minensis</i> Costa Lima, 1937	PIURA: HUANCAMABA: Canchaque (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Pasamayo, Ajipampa, Anchanchón; SANTA CRUZ: Montesco (Korytkowski y Ojeda, 1969)
26. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	PERÚ (Korytkowsky, 1993)
27. <i>A. mucronata</i> Stone, 1942	PERÚ (Korytkowski, 1993)
28. <i>A. nigripalpis</i> Hendel, 1914	CUSCO: Mashagua (Greene, 1934), Río Urubamba (Stone, 1942), Urubamba (Korytkowski y Ojeda, 1968)
29. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	PIURA: SULLANA: Marcavelica, Querecotillo; PIURA: Catacaos; MORROPON: Chulucanas, Pachas (Korytkowski y Ojeda, 1969); LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Jayanca, Mochumí; FERREÑAFE: Ferreñafe; CHICLAYO: Tulipe, Ucupe (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Carrizal (Korytkowski y Ojeda, 1969)
30. <i>A. ornata</i> Aldrich, 1925	PERÚ (Korytkowsky, 1993)
31. <i>A. perdita</i> Stone, 1942	TUMBES: TUMBES: San Pedro de Incas (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽²⁾
32. <i>A. pickeli</i> Costa Lima, 1934	CAJAMARCA: CHOTA: Cochabamba (Korytkowski y Ojeda, 1969)
33. <i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	CAJAMARCA: CHOTA: Ajipampa, Anchanchón (Korytkowski y Ojeda, 1969)

(1) Este registro correspondería a *A. lathana*, reconocida como sinonimia para *A. ludens* (Hernández, 1992). Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) Perú está libre de *A. ludens*.

(2) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. obliqua*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

Perú-4

34. <i>A. rheediae</i> Stone, 1942	CAJAMARCA: CHOTA: Carrizal, Torgo Pampa, Peña de los Loros, Pasamayo (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽¹⁾
35. <i>A. schulzi</i> Blanchard, 1938	CUSCO (Stone, 1942, como <i>A. inca</i>)
36. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	LIMA: (Greene, 1934), Malambo (Greene, 1934); LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Lambayeque; FERREÑAFE: Ferreñafe (Korytkowski y Ojeda, 1969); LIBERTAD: PASCAMAYO: Chepén (Korytkowski y Ojeda, 1969)
37. <i>A. shannoni</i> Stone, 1942	PERÚ: Chimbotes, Amazonas (Stone, 1942); LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Jayanca (Korytkowski y Ojeda, 1969); LORETO: CHIMBOTES (Norrblom, 1991-D)
38. <i>A. spatulata</i> Stone, 1942	CAJAMARCA: CHOTA: Peña de los Loros (Korytkowski y Ojeda, 1969)
39. <i>A. steynskali</i> Korytkowski, 1974	HUÁNUCO: LEONCIO PRADO: Anda, HUAMALÍES: Bella Rondos, Naranjillos (Korytkowski, 1974); SAN MARTÍN: MARISCAL CÁCERES : Tocache (Korytkowski, 1974); CUSCO (Korytkowski, 1974); AMAZONAS: BAGUA: Río Huahuasa (Korytkowski, 1974)
40. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	PIURA: SULLANA: Marcavelica, Querecotillo (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Lisco, Torgopampa (Korytkowski y Ojeda, 1969); MADRE DE DIOS: Manu (Steck, 1991)
40.1. <i>A. suspensa</i> (Loew), 1862	Identificación errónea, corresponde a <i>A. fraterculus</i> (Korytkowski, 1993); TUMBES: CONTRALMIRANTE VILLAR: Cañaveral, Gramadal (Korytkowski y Ojeda, 1969)
41. <i>A. tecta</i> Zucchi, 1979	PERÚ (Hernández et al., 1993)
42. <i>A. turicai</i> Blanchard, 1961	LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Mochumí (Korytkowski y Ojeda, 1969)
43. <i>A. turpinae</i> Stone, 1942	CAJAMARCA: CHOTA: Torgopampa, Anchancón (Korytkowski y Ojeda, 1969) ⁽²⁾
44. <i>A. zuelaniae</i> Stone, 1942	LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE: Tucume, Chiclao, Cayaltí (Korytkowski y Ojeda, 1969); PIURA: HUANCABAMBA: Canchaque, km 33 Olmos, Río Marañon (Korytkowski y Ojeda, 1969); CAJAMARCA: CHOTA: Lisco. Cochabamba, Ajipampa (Korytkowski y Ojeda, 1969)

(1) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. tecta*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

(2) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. fraterculus*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Perú	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	HUÁNUCO: Valle del Huánuco (Cuculiza et al., 1975); PIURA: Chulucanas (Herrera et al., 1977); ICA: valle de Palpa (Ramos et al., 1974); MOQUEGUA: Estiquiña, Semegua, Rinconada (Simon et al., 1972); TACNA: Santa Rosa (Harris et al., 1991)

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. lycopersella</i> Smyth, 1960	LIMA: Cartavio, Lima (Foote, 1981), TRUJILLO: Río Chicama (Foote, 1967, 1981)
2. <i>R. metallica</i> Hendel, 1868	PERÚ (Foote, 1981); AREQUIPA (Foote, 1967)
3. <i>R. nova</i> (Schiner), 1868	PERÚ (Foote, 1967)
4. <i>R. psalida</i> Hendel, 1914	JUNIN: Ocabamba, Huancayo (Foote, 1981); CAJAMARCA (Foote, 1981); CUSCO: Maras, Sicuani (Foote, 1981), Urubamba (Foote, 1967, 1981)
5. <i>R. tomatis</i> Foote, 1981	MOQUEGUA (Foote, 1981)

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>T. curvicauda</i> Gerstaecker, 1860	PERÚ (Quezada, 1980)

3.11 SURINAME

Suriname-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. atrigona</i> Hendel, 1914	SURINAME (Greene, 1934; Stone, 1942)
2. <i>A. convoluta</i> Stone, 1942	SURINAME (Koritkowski, 1993)
3. <i>A. fraterculus</i> (Wied.)	SURINAME (Rohwer, 1992)
4. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	SURINAME (Rohwer, 1992)
5. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	SURINAME (Stone, 1942, Rohwer, 1992)
6. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	SURINAME (Stone, 1942)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock, 1994	SURINAME (White et al., 1992; Drew y Hancock, 1994); CORONIE (Huiswoud et al., 1990; Sauers-Muller, 1991, 1992, 1993b; IICA, 1996a); Totness (Sauers-Muller, 1993a); SARAMACCA (Huiswoud et al., 1990; Sauers-Muller, 1991, 1993a; IICA, 1996a); PARAMARIBO (Huiswoud et al., 1990; Sauers-Muller, 1991, 1993b, IICA, 1996a); COMMEWIJNE (Sauers-Muller, 1991, 1993b); MAROWIJNE : Río Marowijne (Sauers-Muller, 1993a); Albina (Huiswoud et al., 1990); NICKERIE : Wageningen (Sauers-Muller, 1993a); BROKOPONDO (Sauers-Muller, 1991); Lago Brokopondo (Huiswoud et al., 1990); SIPALIWINI (Sauers-Muller, 1991); Apura (Sauers-Muller, 1993a; IICA, 1996a); Washabo (Huiswoud et al., 1990; Sauers-Muller, 1993a; IICA, 1996a); WANICA : (Sauers – Muller, 19991); PARA : (Sauers – Muller, 1991).

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	SURINAME (Foote, 1980) ⁽¹⁾

(1) Aunque no se dispone de una publicación oficial que rectifique el registro de Foote (1980), las autoridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Suriname han solicitado que se aclare que "la Mosca del Mediterráneo nunca ha sido encontrada en ese país" (mensaje del 23 de febrero de 1999).

Suriname-2

Especies del género ***Rhagoletis***, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Suriname.	

Especies del género ***Toxotrypana***, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Suriname.	

3.12 URUGUAY ⁽¹⁾

Uruguay-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. distans</i> Hendel, 1914	URUGUAY (Greene, 1934, en clave)
2. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	URUGUAY (Stone, 1942; CIE, 1958a; Rohwer, 1992)
3. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	URUGUAY (Rohwer, 1992)

Especies del género *Bactrocera*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Uruguay.	

Especies del género *Ceratitis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1924	URUGUAY (Foote, 1967; CIE; 1967, 1984); SALTO (Vadora et al., 1993)

Especies del género *Rhagoletis*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>R. ferruginea</i> Hendel, 1927	MONTEVIDEO: Montevideo (Foote, 1967)

Especies del género *Toxotrypana*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Uruguay.	

(1) Con ocasión de las Reuniones XXIII (Salvador, Brasil) y XXV (Asunción, Paraguay) del Consejo Directivo del COSAVE, los miembros del mismo, al considerar la presente publicación como si fuera un listado de plagas cuarentenarias – que no lo es, ni ha pretendido serlo – manifestaron algunas inquietudes en relación con los listados de especies de Moscas de las Frutas reportados en la bibliografía internacional para los cinco países del Cono Sur, plantearon su deseo de que pudieran ser modificados en función de los Listados A1 y A2 de Plagas Cuarentenarias del COSAVE, y ratificaron la vigencia de estos últimos Listados mediante Resolución No. 144-23/98D, con el reconocimiento de ellos “como el único documento referencial de esta materia y como instrumento básico de negociación en el intercambio comercial de productos agrícolas”.

3.13 VENEZUELA

Venezuela-1

Especies del género *Anastrepha*, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>A. aberrans</i> Norrbom, 1993	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
2. <i>A. acris</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Foote, 1967)
3. <i>A. alveata</i> Stone, 1942	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Stone, 1942)
4. <i>A. anduzei</i> Stone, 1942	CARABOBO: San Esteban (Foote, 1967)
5. <i>A. anomala</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
6. <i>A. antunesi</i> Lima, 1938	VENEZUELA (Foote, 1967)
7. <i>A. atrigona</i> Hendel, 1914	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Foote, 1967); AMAZONAS: Cerro Duida (Norrbom, 1991); ARANGUA: El Limón, Rancho Grande, Portachuelo (Norrbom, 1991)
8. <i>A. barnesi</i> Aldrich, 1925	VENEZUELA (Foote, 1967-D)
9. <i>A. bezzii</i> Costa Lima, 1934	GUÁRICO: San Juan de los Morros (Stone, 1942; Norrbom, 1991); ARAGUA: Gonzalito, El Limón (Norrbom, 1991); Maracay (Norrbom, 1991)
10. <i>A. canalis</i> , Stone 1942	VENEZUELA: San Esteban (Stone, 1942)
11. <i>A. castilloi</i> Norrbom, 1991	BOLIVAR: Auyan - Tepui (Norrbom, 1991)
12. <i>A. chilcayae</i> Greene, 1934	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Foote, 1967)
13. <i>A. convoluta</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Foote, 1967-D; Hernández et al., 1993)
14. <i>A. cordata</i> Aldrich, 1925	VENEZUELA (Foote, 1967)
15. <i>A. dissimilis</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Korytkowski, 1993)
16. <i>A. distincta</i> Greene, 1934	MERIDA: Merida (Steck, 1991); ARAGUA: Ocumare de la Costa, El Limón, Macapo (Boscán et al., 1980); CARABOBO: Vigirima (Boscán et al., 1980)
17. <i>A. dryas</i> Stone, 1942	CARABOBO: San Esteban (Foote, 1967)
18. <i>A. elongata</i> Fernández, 1953	ARAGUA: Rancho Grande (Foote, 1967)
19. <i>A. fernandezi</i> Caraballo, 1985	ARAGUA: Rancho Grande (Norrbom et al., 1988b)
20. <i>A. flavipennis</i> Greene, 1934	VENEZUELA (Korytkowski, 1993)

Venezuela-2

21. <i>A. fraterculus</i> (Widemann), 1830	ARAGUA: Maracay (Boscán, 1993), La Mora (10 km. sur colonia Tovar) (Steck, 1991), Ocumare de la Costa, Colonia Tovar, Costa Limón, La Lagunita, El Limón (Boscán et al., 1980); MERIDA: Merida (Steck, 1991); Barinas: Las Mesas (15 km al SE de Santo Domingo) (Steck, 1991); DISTRITO FEDERAL: La Caraca (sic) (Steck, 1991); TRUJILLO: La Puerta, Durí, San Antonio, Niquitao, Baconó, Piedra Ancha, Biscucuy, Jajó (Boscán et al., 1980); MIRANDA: El Jarillo (Boscán et al., 1980)
22. <i>A. gigantea</i> Stone 1942	VENEZUELA (Korytkowski, 1993)
23. <i>A. grandis</i> (Macquart), 1846	VENEZUELA (Foote, 1967; Rhower, 1992); ARAGUA: El Cataño, El Limón (Boscán et al., 1980), Rancho Grande (Norrbom, 1991); CARABOBO: Las Trincheras (Norrbom, 1991).
24. <i>A. guianae</i> Stone, 1942	CARABOBO (Foote, 1967)
25. <i>A. leptozona</i> Hendel, 1914	ARAGUA: Rancho Grande (Foote, 1967); DISTRITO FEDERAL: El Valle (Foote, 1967)
26. <i>A. limae</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
27. <i>A. loewi</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Stone, 1942)
28. <i>A. macrura</i> Hendel, 1914	VENEZUELA (White et al., 1992; Hernández et al., 1993)
29. <i>A. manihoti</i> Lima, 1934	VENEZUELA (Foote, 1967)
30. <i>A. margarita</i> Caraballo, 1985	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
31. <i>A. montei</i> Costa Lima, 1934	VENEZUELA (Foote, 1967-D)
32. <i>A. munda</i> Schiner, 1868	VENEZUELA (Stone, 1942)
33. <i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	ARAGUA: Macapo, Cagua, Ocumare de la Costa, Tocorón, La Victoria, Choroni, El Castaño (Boscán et al., 1980), Maracay, El Limón (Boscán et al., 1980; Boscán et al., 1986); MERIDA: Carretera 7 km camino a Puerto Nuevo (Steck, 1991); SUCRE: Cumanacoa, El Muco (Boscán et al., 1980); MONAGAS: El Furrial (Boscán et al., 1980); CARABOBO: Hacienda Cúpira, Valencia, San Diego, Yuma, Vigirima, Central Tacarigua (Boscán et al., 1980); TRUJILLO: Valera, Carvajal, Trujillo, San Genaro, El Filo, San Luis, Betijoque, La Cabaña, Cuba, La Concepción, Flor de Patria (Boscán et al., 1980); TÁCHIRA: Ureña, Santa Ana (Boscán et al., 1980); MONAGAS: El Zamuro (Boscán et al., 1980)
34. <i>A. obscura</i> Aldrich, 1925	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
35. <i>A. pallidipennis</i> Greene, 1934	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)

Venezuela-3

36. <i>A. parishi</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
37. <i>A. pickeli</i> Costa Lima, 1934	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Stone, 1942)
38. <i>A. pittieri</i> Caraballo, 1985	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
39. <i>A. pseudorobusta</i> Norrbom, 1985	VENEZUELA (Korytkowski, 1993)
40. <i>A. pulchra</i> Stone, 1942	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
41. <i>A. reichardti</i> Zucchi, 1979	VENEZUELA (Hernández et al., 1993)
42. <i>A. rhediiae</i> Stone, 1942	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Foote, 1967)
43. <i>A. robusta</i> Greene, 1934	BOLIVAR: Ciudad Bolívar (Greene, 1934)
44. <i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	MIRANDA: Parque Nacional Guatopo (Steck et al. 1990); MERIDA: Merida (Steck et al., 1990); ARAGUA: Ocumare de la Costa, El Limón, Macapo, Colonia Tovar, Choroní (Boscán et al., 1980), Maracay (Steck et al., 1990); TÁCHIRA: La Grita (Boscán et al., 1980); DISTRITO FEDERAL: Caracas (Boscán et al., 1980); CARABOBO: Central Tacarigua (Boscán et al., 1980); TRUJILLO: El Amparo (Boscán et al., 1980); NUEVA ESPARTA: Las Piedras, El Copey, San Sebastián, Fuentidueño, San Juan (Boscán et al., 1980)
45. <i>A. shannoni</i> , Stone 1942	BOLIVAR: Caura Val. (Norrbom, 1991)
46. <i>A. sororcula</i> Zucchi, 1979	VENEZUELA (Korytkowski, 1993)
47. <i>A. striata</i> Schiner, 1868	ARAGUA: Rancho Grande, Macapo, El Limón, La Providencia, Guamita, Ocumare de la Costa, Colonia Tovar, El Consejo, Tocorón (Boscán et al., 1980); Cagua (Boscán et al., 1987), Maracay (Boscán et al., 1980; Steck, 1991); MERIDA: Merida (Steck, 1991); MIRANDA: Caucagua (Boscán et al., 1980); Parque Nacional Guatopo (Steck, 1991); CARABOBO: Mariara, Yagua, Central Tacarigua, Vigirima (Boscán et al., 1980); NUEVA ESPARTA: Granja Salamanca, El Copey, San Sebastián (Boscán et al., 1980); TACHIRA: Santa Ana (Boscán et al., 1980); ANZOÁTEGUI: El Tigre, Barcelosna (Boscán et al., 1980); YARACUY: San Felipe (Boscán et al., 1980); PORTUGUESA: Turén (Boscán et al., 1980); SUCRE: Carúpano, El Muco (Boscán et al., 1980); MONAGAS: Maturín, Caripito (Boscán et al., 1980)
48. <i>A. sylvicola</i> Knab, 1915	DISTRITO FEDERAL: El Valle (Foote, 1967)

Venezuela-4

Especies del género ***Bactrocera***, por orden alfabético

Especie	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Venezuela.	

Especies del género ***Ceratitis***, por orden alfabético.

Especie	Reportes y referencias
1. <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.), 1824	VENEZUELA (CIE, 1967, 1984; Rohwer, 1992); ARAGUA: Maracay (Boscán <i>et al.</i> , 1995); MIRANDA (CIE, 1984)

Especies del género ***Rhagoletis***, por orden alfabético.

Especies	Reportes y referencias
1. <i>Rhagoletis metallicus</i> (Schiner), 1868	VENEZUELA (Foote, 1967; 1981)

Especies del género ***Toxotrypana***, por orden alfabético.

Especies	Reportes y referencias
No existen especies de este género reportadas para Venezuela.	

VI. LISTADO EN ORDEN ALFABÉTICO DE ESPECIES DE LOS GENEROS *Anastrepha*, *Bactrocera*, *Ceratitis*, *Rhagoletis* y *Toxotrypana*, REPORTADAS PARA AMERICA DEL SUR POR PAISES

4.1 Listado en orden alfabético, de especies del género *Anastrepha* Schiner, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.

A. <i>aberrans</i> Norrbom, 1993	Venezuela
A. <i>acris</i> Stone, 1942	Venezuela
A. <i>aczeli</i> Blanchard, 1961	Argentina
A. <i>alveata</i> Stone, 1942	Argentina-D, Brasil, Venezuela
A. <i>alveatoides</i> Blanchard, 1961	Argentina
A. <i>ambigua</i> Norrbom, 1985	Brasil-D
A. <i>amita</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>amnis</i> Stone, 1942	Brasil
A. <i>anduzei</i> Stone, 1942	Venezuela
A. <i>anomala</i> Stone, 1942	Colombia, Venezuela
A. <i>antunesi</i> Costa Lima, 1938	Brasil, Perú ⁽¹⁾ , Venezuela
A. <i>atrigona</i> Hendel, 1914	Brasil, Guyana, Surinamee, Venezuela
A. <i>atrox</i> Aldrich, 1925	Ecuador, Perú
A. <i>bahiensis</i> Costa Lima, 1937	Brasil, Colombia, Ecuador, Perú
*A. <i>balloui</i> Stone, 1942	ver A. <i>bezzii</i>
*A. <i>barandiaranae</i> Korytkowski y Ojeda, 1968	ver A. <i>atrox</i>
A. <i>barbiellinii</i> Costa Lima, 1938	Argentina, Brasil, Perú
A. <i>barnesi</i> Aldrich, 1926	Brasil, Guyana, Venezuela-D
A. <i>barretoi</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>belenensis</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>benjamini</i> Costa Lima, 1938	Brasil
A. <i>bezzii</i> Costa Lima, 1934	Brasil, Perú ⁽²⁾ , Venezuela
A. <i>binodosa</i> Stone, 1942	Brasil
A. <i>bistrigata</i> Bezzi, 1919	Brasil, Perú ⁽³⁾
A. <i>bivittata</i> (Macquart), 1843	Brasil -D
A. <i>bondari</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>borgmeieri</i> Costa Lima, 1934	Brasil
*A. <i>braziliensis</i> Greene, 1934	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>canalis</i> Stone, 1942	Venezuela
A. <i>castilloi</i> Norrbom, 1991	Venezuela
A. <i>caudata</i> Stone, 1942	Brasil
A. <i>chiclayae</i> Greene, 1934	Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela
A. <i>concava</i> Greene, 1934	Brasil, Ecuador, Perú
A. <i>conjuncta</i> Hendel, 1914	Bolivia

(1) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. obliqua*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

(2) y (3) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) estos registros corresponderían a identificaciones realizadas con "Material de Brasil". No se dispone de las respectivas publicaciones oficiales de confirmación.

A. <i>connexa</i> Costa Lima, 1938	Brasil
A. <i>consobrina</i> (Loew), 1873	Argentina, Brasil, Guyana
A. <i>convoluta</i> Stone, 1942	Guyana, Suriname, Venezuela
A. <i>cordata</i> Aldrich, 1925	Venezuela
A. <i>coronilli</i> Carrejo y G., 1993	Colombia
* A. <i>correntina</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>dissimilis</i>
A. <i>costalimai</i> Autuori, 1936	Brasil
* A. <i>costarukmanii</i> Capoor, 1954	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>crebra</i> Stone, 1942	Ecuador
A. <i>cruzi</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>cryptostrepha</i> Hendel, 1914	Ecuador, Perú
A. <i>curitis</i> Stone, 1942	Brasil, Colombia
A. <i>daciformis</i> Bezzi, 1909	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú
* A. <i>dangeloi</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>punctata</i>
* A. <i>discessa</i> Stone, 1942	ver A. <i>benjamini</i>
A. <i>dissimilis</i> Stone, 1942	Argentina, Brasil, Guyana, Perú,
Venezuela	Brasil, Perú, Uruguay
A. <i>distans</i> Hendel, 1914	Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
A. <i>distincta</i> Greene, 1934	Guyana, Perú, Venezuela
A. <i>distincta</i> var. <i>minensis</i> Costa Lima, 1937	Brasil
A. <i>dryas</i> Stone, 1942	Ecuador, Venezuela
A. <i>duckei</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>elegans</i> Blanchard, 1937	Argentina, Brasil, Paraguay
A. <i>elongata</i> Fernández, 1953	Venezuela
A. <i>ethalea</i> (Walker), 1849	Argentina-D, Brasil
* A. <i>extensa</i> Stone, 1942	ver A. <i>minensis</i>
A. <i>fenestrata</i> Lutz y Costa Lima, 1918	Brasil
A. <i>fernandezii</i> Caraballo, 1985	Venezuela
A. <i>fischeri</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>flavipennis</i> Greene, 1934	Argentina, Brasil, Venezuela
A. <i>flavissima</i> Hering, 1940	Perú
A. <i>fractura</i> Stone, 1942	Guayana
A. <i>fraterculus</i> (Widemann), 1830	Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile-E, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>aciduciformis</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>ethaleiformis</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>intensa</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>intermissa</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>peruviana</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>retracta</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>soluta</i> Bezzi, 1909	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>subtypica</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
* A. <i>fraterculus</i> var. <i>typica</i> Blanchard, 1961	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>freidbergi</i> Norrbom, 1993	Bolivia
* A. <i>frutalis</i> (Weyenbergh), 1874	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>fumipennis</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>furcata</i> Costa Lima, 1934	Brasil
* A. <i>fuscobasalis</i> Hering, 1935	ver <i>Stoneola fuscobasalis</i>

A. <i>gigantea</i> Stone, 1942	Venezuela
A. <i>goldbachii</i> Blanchard, 1961	Argentina
A. <i>grandicula</i> Norrbom, 1991	Colombia
A. <i>grandis</i> (Macquart), 1846	Argentina, Bolivia, Brasil-A, Colombia, Ecuador-A, Paraguay, Perú, Venezuela
A. <i>greenei</i> Costa Lima, 1937	Brasil, Ecuador
A. <i>guianae</i> Stone, 1942	Guyana, Venezuela
A. <i>hamata</i> (Loew), 1873	Brasil
A. <i>hambletoni</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>hastata</i> Stone, 1942	Brasil
A. <i>haywardi</i> Blanchard, 1937	Argentina
* A. <i>hendeli</i> Greene, 1934	ver A. <i>punctata</i>
* A. <i>hendeliana</i> Costa Lima, 1934	ver A. <i>longicauda</i>
A. <i>hermosa</i> Norrbom & Kim, 1988	Bolivia, Perú
* A. <i>inca</i> Stone, 1942	ver A. <i>schultzi</i>
A. <i>integra</i> (Loew), 1873	Brasil, Guyana-D
A. <i>irradiata</i> Blanchard, 1961	Argentina
A. <i>kuhlmanni</i> Costa Lima, 1934	Argentina, Brasil
A. <i>lambayacae</i> Korytkowski y Ojeda, 1968	Perú
A. <i>lambda</i> Hendel, 1914	Perú
A. <i>lanceola</i> Stone, 1942	Perú
* A. <i>lathana</i> Stone, 1942	ver A. <i>ludens</i>
* A. <i>latifasciata</i> Hering, 1935	ver A. <i>grandis</i>
A. <i>leptozena</i> Hendel, 1914	Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela
* A. <i>ligata</i> Costa Lima, 1934	ver A. <i>obliqua</i>
A. <i>limae</i> Stone, 1942	Venezuela, Colombia - D
A. <i>loewi</i> Stone, 1942	Venezuela
A. <i>longicauda</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>ludens</i> (Loew), 1873	Colombia, Perú ⁽¹⁾
A. <i>luederwaldti</i> Costa Lima, 1934	Brasil
A. <i>lutzi</i> Costa Lima, 1934	Argentina, Brasil
A. <i>macrura</i> Hendel, 1914	Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela
A. <i>manihoti</i> Costa Lima, 1934	Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
A. <i>margarita</i> Caraballo, 1985	Venezuela
A. <i>materetela</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>mburucuyae</i> Blanchard, 1961	Argentina
* A. <i>mellea</i> Walker, 1837	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>megacantha</i> Zucchi, 1984	Brasil
A. <i>minensis</i> Costa Lima, 1937	Brasil, Perú
* A. <i>minor</i> Costa Lima, 1934	ver A. <i>punctata</i>
A. <i>mixta</i> Zucchi, 1979	Brasil
* A. <i>mombinpraeoptans</i> Sein, 1933	ver A. <i>obliqua</i>
A. <i>montei</i> Costa Lima, 1934	Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela-D

⁽¹⁾ Este registro correspondería a A. *lathana*, reconocida como sinonimia para A. *ludens* (Hernández, 1992). Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) Perú está libre de A. *ludens*.

<i>A. mucronata</i> Stone, 1942	Colombia, Ecuador, Perú Venezuela
<i>A. munda</i> Schiner, 1868	
<i>A. nascimentoi</i> Zucchi, 1979	Brasil
<i>A. nigripalpis</i> Hendel, 1914	Bolivia, Ecuador, Perú
<i>A. nunezae</i> Steyskal, 1977	Colombia
<i>A. obliqua</i> (Macquart), 1835	Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela
* <i>A. oblitteratella</i> Blanchard, 1961	ver <i>A. schultzi</i>
<i>A. obscura</i> Aldrich, 1925	Brasil, Venezuela
<i>A. ornata</i> Aldrich, 1925	Ecuador, Perú, Colombia
<i>A. pallidipennis</i> Greene, 1934	Colombia, Venezuela
<i>A. parallela</i> (Wiedemann), 1830	Brasil, Guyana-D, Paraguay-D
<i>A. parishi</i> Stone, 1942	Guyana, Venezuela
<i>A. pastranai</i> Blanchard, 1961	Argentina
<i>A. perdita</i> Stone, 1942	Brasil, Perú ⁽¹⁾
* <i>A. peruviana</i> Townsend, 1913	ver <i>A. fraterculus</i>
<i>A. phaeoptera</i> Costa Lima, 1937	Brasil
<i>A. pickeli</i> Costa Lima, 1934	Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela
<i>A. pittieri</i> Caraballo, 1985	Venezuela
* <i>A. procurvata</i> Blanchard, 1961	ver <i>A. montei</i>
* <i>A. pseudofraterculus</i> Capoor, 1955	ver <i>A. fraterculus</i>
<i>A. pseudoparallela</i> (Loew), 1873	Argentina, Bolivia-D, Brasil, Ecuador, Perú
* <i>A. pseudopunctata</i> Blanchard, 1961	ver <i>A. punctata</i>
<i>A. pseudorobusta</i> Norrbom, 1985	Venezuela
<i>A. pulchra</i> Stone, 1942	Venezuela
<i>A. punctata</i> Hendel, 1914	Argentina, Brasil, Paraguay
<i>A. quararibeae</i> Costa Lima, 1937	Brasil
<i>A. quiinae</i> Costa Lima, 1937	Brasil
<i>A. reichardti</i> Zucchi, 1979	Brasil, Venezuela
<i>A. repanada</i> Blanchard, 1961	Argentina
<i>A. rheediae</i> Stone, 1942	Brasil, Colombia, Ecuador, Perú ⁽²⁾ , Venezuela
<i>A. robusta</i> Greene, 1934	Brasil-D, Venezuela
<i>A. rosilloi</i> Blanchard, 1961	Argentina
<i>A. sagittifera</i> Zucchi, 1979	Brasil
* <i>A. schineri</i> Hendel, 1914	ver <i>A. grandis</i>
* <i>A. scholae</i> Capoor, 1955	ver <i>A. fraterculus</i>
<i>A. schultzi</i> Blanchard, 1938	Argentina, Perú Argentina, Brasil,
<i>A. serpentina</i> (Wiedemann), 1830	Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela
<i>A. shannoni</i> Stone, 1942	Brasil, Perú, Venezuela
* <i>A. silvai</i> Costa Lima, 1934	ver <i>A. distincta</i>

(1) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. obliqua*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

(2) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. tecta*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

A. <i>similis</i> Greene, 1934	Brasil
A. <i>simulans</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>sinvali</i> Zucchi, 1982	Brasil
A. <i>sodalis</i> Stone, 1942	Brasil
*A. <i>soluta</i> Bezzi, 1909	ver A. <i>fraterculus</i>
A. <i>sororcula</i> Zucchi, 1979	Brasil, Ecuador, Venezuela
A. <i>spatulata</i> Stone, 1942	Perú
A. <i>steyskali</i> Korytkowski, 1974	Perú
A. <i>striata</i> Schiner, 1868	Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela
A. <i>submunda</i> Costa Lima, 1937	Brasil
A. <i>suspensa</i> (Loew), 1862	Perú (Identificación errónea)
A. <i>sylvicola</i> Knab, 1915	Venezuela
A. <i>tecta</i> Zucchi, 1979	Ecuador, Perú
A. <i>tenella</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>townsendi</i> Greene, 1934	Brasil, Ecuador
*A. <i>triangulata</i> Shaw, 1962	ver A. <i>spatulata</i>
A. <i>turicai</i> Blanchard, 1961	Argentina, Perú
A. <i>turpinae</i> Stone, 1942	Perú ⁽¹⁾
A. <i>umbrosa</i> Blanchard, 1961	Argentina
A. <i>undosa</i> Stone, 1942	Brasil, Bolivia
*A. <i>unicolor</i> Loew, 1862	ver A. <i>fraterculus</i>
*A. <i>vittithorax</i> (Macquart), 1851	ver A. <i>serpentina</i>
A. <i>xanthochaeta</i> Hendel, 1914	Brasil
A. <i>zenilda</i> Zucchi, 1979	Brasil
A. <i>zernyi</i> Costa Lima, 1934	Argentina, Brasil
*A. <i>zikani</i> Costa Lima, 1934	ver A. <i>consobrina</i>
A. <i>zuelaniae</i> Stone, 1942	Perú

4.2 Listado en orden alfabético, de especies del género *Bactrocera* Macquart, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.

<i>Bactrocera caramboleae</i> Drew & Hancock, 1991	Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Suriname
<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt),	Chile (Isla de Pascua)-E

4.3 Listado en orden alfabético, de especies del género *Ceratitis* MacLeay, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.

<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedeman), 1824	Argentina-A, Bolivia, Brasil, Chile-E, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname ⁽¹⁾ , Uruguay, Venezuela.
--	---

(1) Según CARTA No. 1554-97-AG-SENASA (23 de enero de 1998) este registro correspondería a *A. fraterculus*. No se dispone de la respectiva publicación oficial de confirmación.

4.4 Listado en orden alfabético, de especies del género *Rhagoletis* Loew, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.

<i>Rhagoletis adusta</i> Foote, 1981	Brasil
<i>R. blanchardi</i> Aczél, 1954	Argentina, Bolivia, Brasil
<i>R. conversa</i> (Brèthes), 1919	Chile
<i>R. ferruginea</i> Hendel, 1927	Argentina, Brasil, Uruguay
<i>R. lycopersella</i> Smyth, 1960	Perú
<i>R. macquartii</i> (Loew), 1873	Brasil
<i>R. metallica</i> Hendel, 1868	Perú, Venezuela
<i>R. nova</i> (Schiner), 1868	Chile, Perú
<i>R. ochraspis</i> Wiedemann, 1830	Argentina, Brasil, Chile (<i>Nomen dubium</i>)
<i>R. penela</i> Foote, 1981	Chile
<i>R. pomonella</i> (Walsh), 1867	Colombia-D
<i>R. psalida</i> Hendel, 1914	Perú
<i>R. rhytida</i> Hendel, 1914	Bolivia, Ecuador
* <i>R. scutellaris</i> Macquart, 1851	ver <i>R. macquartii</i>
<i>R. tomatis</i> Foote, 1981	Chile, Perú
<i>R. willinki</i> Aczél, 1950	Argentina

4.5 Listado en orden alfabético, de especies del género *Toxotrypana* Gerstaecker, (Diptera: Tephritidae) reportadas para América del Sur por países.

<i>Toxotrypana australis</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>T. curvicauda</i> Gerstaecker, 1860	Brasil, Colombia, Perú
<i>T. littoralis</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>T. nigra</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>T. picciola</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>T. proseni</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>T. pseudopicciola</i> Blanchard, 1959	Argentina
<i>Toxotrypana</i> sp.	Ecuador

(1) Aunque no se dispone aun de una publicación oficial que rectifique el registro de Foote (1980), las autoridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Suriname han solicitado que se aclare que "la Mosca del Mediterráneo nunca ha sido encontrada en ese país" (mensaje del 23 de febrero de 1999).

V. REFERENCIAS

1. AGUIAR, E.L.; MENEZES, E.B. 1996. Population dynamics of fruit flies in Itaguaí County, State of Rio de Janeiro, Brazil. I-survey of the species. In *Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management*. Ed. by B. A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p.321-323.
2. ALAMA, D. 1999. Ensayos para determinar niveles de oviposición de *Anastrepha fraterculus* (Wied.) sobre fruta y dispositivos artificiales. In *The South American Fruit Fly, Anastrepha fraterculus* (Wied.); advanced in artificial rearing taxonomic status and biological studies. Proceeding of workshop, Viña del Mar, Chile November 1996, FAO/OIEA. Pp. 79 – 83.
3. ARAUJO, E.L.; ZUCCHI, R.A.; CANAL D., N.A. 1996. Caracterização e ocorrência de *Anastrepha zenilidae* Zucchi (Diptera: Tephritidae) e seus parasitóides (Hymenoptera: Braconidae) numa nova plant hospedeira, no Rio Grande do Norte. Anais da Soc. Entomol. do Brasil (Brasil), 25(1): 147-150. (RAE 84(11) 10.831)
4. AREVALO, E.P. 1997. Principales especies de moscas de la fruta en Colombia. Biología y hábitos. Noticampo (Colombia) 4: 10 – 16.
5. ARUANI, R.; CERESA, R.A.; GRANADOS, J.C.; TARET, G.; PERUZZOTTI, P.; ORTIZ, G. 1996. Advanced in the National fruit fly control and erradication program in Argentina. In *Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management*. Ed. by B. A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, Sta Lucia Press. Pp.: 521 – 530.
6. BATEMAN, M.A.; INSUNZA, V.; ARRETZ V.P. 1973. The eradication of Queensland fruit fly from Easter Island. FAO. Plant Prot. Bull. 21(5): 114.
7. BERNAL, J.A.E. 1996. Plagas y enfermedades de la Granadilla (*Psidium ligularis*). In: *Plagas y enfermedades en frutas tropicales*. Instituto Colombiano Agropecuario, Santafé de Bogotá, DC. p. 29-36.
8. BLANCHARD, E.E. 1959. El género "Toxotrypana" en la República Argentina. Acta Zoológica Lilloana (Argentina), 17: 33-44.
9. _____ 1961. Especies argentinas del género *Anastrepha* Schiner (sens. lat.) (Diptera, Trypetidae). Rev. Invest. Agric. (Argentina) 15 (2): 281-342.
10. BOSCÁN, N.M.; DEDORDY, J.R.; REQUENA, J.R. 1980. Estado actual de la Reportes geográfica y hospederas de *Anastrepha* spp. (Diptera: Tephritidae) en Venezuela. Agronomía Tropical (Venezuela) 30(1/6): 55-63.
11. _____; GODOY, F.J. 1986. Influencia de los factores meteorológicos sobre la fluctuación poblacional de *Anastrepha obliqua* McQuart (Diptera: Tephritidae) en mango. Agronomía Tropical (Venezuela) 36(1/3): 55-65.
12. _____; _____. 1987. Fluctuación poblacional de *Anastrepha striata* Schiner, la mosca de la guayaba (*Psidium guajava* L.) en Cagua, Venezuela. Agronomía Tropical (Venezuela) 37(4/6): 117-121
13. _____. 1993. Niveles de infestación de moscas de las frutas de los géneros *Anastrepha* y *Ceratitis* en mango en Venezuela. Agronomía Tropical (Venezuela) 43(5/6): 319-326.
14. _____; RAMOS, F. 1995. Evaluación de cuatro diseños y distancias de colocación de trampas para la captura de la mosca del Mediterráneo. Agronomía Tropical (Venezuela) 45(2): 313-318.
15. BRESSAN, S.; TELES M.C. 1991. Lista de hospederos e índices de infestação de algumas espécies do género *Anastrepha* Schiner, 1868 (Diptera: Tephritidae) na regiao de Riberao Preto - SP. Anais Soc. Ent. Brasil (Brasil), 20(1): 5-15.
16. BRÉTHES, J. 1913. Las moscas de las plantas. La *Ceratitis* de la cabezuela (*Ceratitis capitata*). Las plagas de la Agricultura (Argentina) 1: 6-12.

17. BUSH, G.L. 1966. The taxonomy, cytology and evolution of the genus *Rhagoletis* in North America (Diptera: Tephritidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard, nº 134. p.431-526.
18. CABANILLA, G.C. DE; ESCOBAR, J. 1993. Free zone program of *Anastrepha grandis* n Ecuador. In Fruit Flies, Biology and Management. Ed. by M. Aluja, P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 443-447.
19. CARVALHO, R. DA S.; NASCIMENTO, A.S.; MORGANTE, J.S.; FONSECA, N. 1996. Susceptibility of different mango varieties (*Mangifera indica*) to the attack of the fruit fly, *Anastrepha obliqua*. In Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B.A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p.325-331.
20. CIE. 1958a. Distribution Maps of Insects Pest, *Anastrepha fraterculus* (Wied.) (Dipt., Trypetidae). London, Commonwealth Institute of Entomology. Series A (Agricultural), (88).
21. _____. 1958b. Distribution Maps of Insects Pest, *Anastrepha mombinpraeoptans* Sein (Dipt., Trypetidae). London, Commonwealth Institute of Entomology. Series A (Agricultural), (90).
22. _____. 1967. Distribution Maps of Pest, *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Mediterranean fruit fly, medfly. London, CAB International Institute of Entomology. Series A (Agricultural), (1) revised.
23. _____. 1984. Distribution Maps of Pest, *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Mediterranean fruit fly, medfly. London, CAB International Institute of Entomology. Series A (Agricultural), (1) revised.
24. COSTILLA, M. A. 1970. Panorama actual de las moscas de los frutos en la provincia de Tucumán. In Jornadas sobre moscas de los frutos. Estación Experimental Agrícola de Tucumán Obispo Colombres. Publicación miscelánea N° 32, marzo de 1970, pp 3 – 4.
25. COUTURIER, G.; ZUCCHI, R.A.; SARAVIA, M.; SILVA, M.N.DA . 1993. New records of fruit flies of the genus *Anastrepha* Schiner, 1868 (Diptera: Tephritidae) and their host plants in the Amazon region. Annales de la Société Entomologique de France 29 (2): 223 - 224. (RAE 83 (12) 11.300).
26. CUCCHI, N.J.A.; A.E. PUIATTI; M. F.GARCIA. 1970. Observaciones sobre la eficiencia de algunos atractivos para la mosca de los frutos en Mendoza. In. Jornadas sobre moscas de los frutos. Estación Experimental Agrícola Obispo Colombres. Publicación miscelánea N°32, marzo de 1970, pp 17 – 28.
27. CUCULIZA, T.M.; TORRES, V.E. 1975. "Moscas de la fruta" en las principales plantas hospederas del Valle de Huánuco. Rev. Per. Entomol. (Perú) 18(1): 76-79.
28. CHIESA, M.O. 1942. Entomología agrícola. Identificación y control de insectos y otros animales dañinos o útiles a las plantas. San Juan, Argentina.
29. DREW, R.A.I.; HANCOCK, D.L. 1994. The *Bactrocera dorsalis* complex of fruit flies (Diptera: Tephritidae: Dacinae) in Asia. Bulletin of Entomological Research. Supplement nº2, 68 p.
30. FAO. 1977. Eradication of the Queensland fruit fly from Easter Island. FAO Plant. Prot. Bull. 25(3): 141.
31. FELLINI, R. 1993. Ocorrencia de *Rhagoletis blanchardi* (Aczél) (Diptera: Tephritidae) em tomateiro. Anais da Soc. Entomol. do Brasil 22(2): 415-416. (RAE 82(6) 5451)
32. FERNÁNDEZ DE ARAOZ, D.; NASCA, A.J. 1984. Especies de Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonidae) parasitoides de moscas de los frutos (Diptera: Tephritidae) colectados en la provincia de Tucumán (Argentina). CIRPON. Rev Invest., 2 (1/2): 37-46.
33. FERNANDES, O.A.; TELES, M.M.C. 1993. Infestation and injuries caused by fruit flies in citrus orchards of state of São Paulo, Brazil. In Fruit Flies, Biology and Management. Ed. by M. Aluja ; P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 151-153.
34. FILHO, N.S.; OLIVEIRA, D.A.; BITRAN, E.A.; SOBRINHO, J.T. 1987. Contribuição ao conhecimento da flutuação populacional de "moscas das frutas" em cítricos. Arq. Inst. Biol., São Paulo (Bra.) 54(1/4): 63-70.

35. FOOTE, R.H. 1967. Family Tephritidae. In A catalogue of the Diptera of the Americas south of the United States. Ed. by P.E. Vanzolini, N. Papavero. Dept. Zool., Sec. Agr., São Paulo, Brasil. Fasc. 57: 1-91.
36. _____. 1980. Fruit fly genera south of the United States (Diptera: Tephritidae). United States Department of Agriculture. Technical Bulletin nº 1600. 79 p.
37. _____. 1981. The genus *Rhagoletis* Loew south of the United States (Diptera: Tephritidae). United States Department of Agriculture. Technical Bulletin nº 1607. 75 p.
38. _____.; MALAVASI, A.; MORGANTE, J.S. 1984. Field observations of distributions and activities of *Rhagoletis conversa* (Diptera: Tephritidae) on two host in nature. Ann. Entomol. Soc. Am. (EE.UU.) 77: 548-551.
39. FONTEMACHI, E.C. 1970. Evaluación de la población de moscas de los frutos en San Juan, estimación del daño. In Jornadas sobre Moscas de los frutos. Estación Experimental Agrícola de Tucumán Obispo Colombres. Publicación Miscelánea Nº 32, marzo de 1970, pp: 17 - 28
40. FRÍAS, L.D. 1986. Biología poblacional de *Rhagoletis nova* (Schiner) (Diptera: Tephritidae). Rev. Chilena Ent. (Chile) 13: 75-84.
41. _____. 1989. Diferenciación ecológica y reproductiva de dos razas huéspedes de *Rhagoletis conversa* (Brèthes) (Diptera: Tephritidae). Acta Ent. Chilena (Chile) 15: 163-170.
42. _____.; NORTHLAND, L.N.; CAPETILLO, A.J. 1991. Aspectos de la biología de *Rhagoletis pomalis* Foote (Diptera : Tephritidae) en poblaciones de la II Región de Chile. Acta Ent. Chilena (Chile) 16: 193-200.
43. _____. 1992. Genética, ecología y evolución de las especies chilenas del género *Rhagoletis* (Diptera: Tephritidae). Acta Ent. Chilena (Chile) 17: 211-223.
44. _____.; GONZÁLEZ, C.; HENRY, A.; ALVIÑA, A. 1993. Reportes geográfica y respuesta visual de *Rhagoletis pomalis* Foote (Diptera: Tephritidae) a trampas esféricas y rectángulos de diferentes colores. Acta Ent. Chilena (Chile) 18: 185-194.
45. GALLI, J.C.; RAMPAZZO, E. F. 1996. Enemigos naturales predadores de *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) capturados con trampas de suelo en huertos de *Psidium guajava* L. Bol. San. Veg. Plagas. 22(2): 297-300.
46. GOMES, S. J.; URAMOTO, K.; MALAVASI, A. 1998. First report of *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) in the eastern Amazon, Pará, Brazil. Florida Entomologist 81 (4): 574-577.
47. GREENE, C.T. 1934. A revision of the genus *Anastrepha* based on a study of the wings and on the length of the ovipositor sheath (Diptera: Tryptidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. (EE.UU.) 36: 127-179.
48. HARRIS, E.J.; OLALQUIAGA, F.G. 1991. Occurrence and distribution patterns of mediterranean fruit fly (Diptera : Tephritidae) in desert areas in Chile and Perú. Environmental Entomology 20 (1): 174-178.
49. _____.; _____. 1993. Influence of habitat on *Ceratitis capitata* response to trimedlure traps. In Fruit Flies, Biology and Management. Ed. by M. Aluja, P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 217-221.
50. HERNÁNDEZ-ORTÍZ, V.; ALUJA, M. 1993. Listado de especies del género neotropical *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) con notas sobre su Reportes y plantas hospederas. Folia Entomol. Mex. (México) 88: 89-105.
51. HERNÁNDEZ-ORTÍZ, V. 1992. El género *Anastrepha* Schiner en México (Diptera: Tephritidae). Taxonomía, distribución y sus plantas huéspedes. Instituto de Ecología. Sociedad Mexicana de Entomología. Xalapa, Veracruz, México. 162 p.
52. HERRERA, A. S. 1977. Current fruit fly situation in Chile. FAO. Plant Prot. Bull. 25 (3):118-119.
53. HERRERA, A.J.; VIÑAS, V.L. 1977. "Moscas de la fruta" (Diptera: Tephritidae) en mangos de Chulucanas, Piura. Rev. Per. Entomol. (Perú) 20 (1): 107-114.(RAE 67 1.123)
54. HUISWOUDE, R.R.; SCHOTMAN, C.Y. 1990. Carambola fruit-fly, *Dacus* sp. near *dorsalis* (Diptera: Tephritidae) in Surinam. FAO. Plant. Prot. Bull. 38 (3): 135-139.

55. IICA. 1996a. Carambola fruit fly projects in Surinam and Guyana. CARAPHIN News (IICA), Nº 13: 6-7.
56. IICA. 1996b. Eradication of *Ceratitis capitata* in Chile. CARAPHIN News (IICA), Nº 14, p. 7.
57. IICA. 1998. Regional CFF News. 1 (3) 4 p.
58. JARA, P.M. 1971. Estudios de campo de *Anastrepha fraterculus* (Wied.). Rev. Per. Entmol. (Perú) 14 (1): 82-86.
59. KORYTKOWSKI, C.G.; OJEDA, D.P. 1968. Especies del género *Anastrepha* Schiner 1868 en el nor-oeste peruano. Rev. Per. Entomol. (Perú), 11(1): 32-70.
60. _____.; OJEDA, D.P. 1969. Reportes ecológica de especies del género *Anastrepha* Schiner en el nor-oeste peruano. Rev. Per. Entomol. (Perú), 12(1): 71-95.
61. _____. 1974. Una nueva especie del género *Anastrepha* Schiner (Diptera: Tephritidae). Rev. Per. Entomol. (Perú), 17(1): 1-3.
62. _____. 1993. Manual de identificación de Moscas de la fruta. Parte II: Género *Anastrepha* Schiner, 1868. Programa de Maestría en Entomología. U. de Panamá. 122 p.
63. LIMA, I.S. DE; HOWSE, P.E.; SALLES, L.A.B. 1994. Reproductive behaviour of the South American fruit fly *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae): laboratory and field studies. Physiological Entomology 19: 271-277.
64. LARRAÍN, P. 1996. Mosca del Pepino dulce ¿amenaza para las exportaciones? Tierra Adentro INIA (Chile) N° 11: 27 – 30.
65. LIFSCHITZ, E.; F. MANSO; A. BASSO. 1999. Karyotype study of the South American Fruit Fly *Anastrepha fraterculus* (Wied.) in Argentina. In The South American Fruit Fly, *Anastrepha fraterculus* (Wied.); advances in artificial rearing, taxonomic status and biological studies. Proceeding of workshop, Viña del Mar, Chile. November 1996. FAO / OIEA. Pp. 21 – 24.
66. LOBOS, A.C. 1993. Programas de erradicación de la mosca de Queensland (*Bactrocera tryoni*) en la Isla de Pascua durante 1971/72 y 1974/76, y su condición actual de área libre de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae). FAO. Plant Prot. Bull. 41 (3-4): 198-199.
67. _____. 1996. Supresión, erradicación y exclusión de las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) de Chile. Agric. Técnica (Chile) 56(2): 75-81.
68. _____. 1999. Antecedentes sobre la detección y erradicación de la mosca sudamericana de la fruta (MSAF) *Anastrepha fraterculus* (Wied.) (Diptera: Tephritidae) de oasis del extremo norte de Chile. In The South American Fruit Fly, *Anastrepha fraterculus* (Wied.); advances in artificial rearing, taxonomic status and biological studies. Proceeding of workshop, Viña del Mar, Chile. November 1996. FAO / OIEA. Pp. 105-110.
69. MALAVASI, A.; ROHWER, G.G.; CAMPBELL, D.S. 1994. Fruit fly free areas: strategies to develop them. In: Fruit flies and the Sterile Insect Technique. Ed. by C. O. Calkins, W. Klassen, P. Liedo. Florida, USA, CRC Press, Inc. p. 165-180.
70. MANERO, E.A. DE; L'ARGENTIER S.M. DE; VILTE, H.A. 1989. Moscas de los frutos (Diptera: Trypetidae), presentes en durazneros de León y Quebrada de Huamahuaca, Pcia. Jujuy, R. Argentina. CIRPON, Revista de Investigación (Argentina). 7(1/4): 7-26.
71. MARKIN, R.W.; MALAVASI, A.; AQUINO, C. 1996. Acoustical comparisions of calling songs from *Anastrepha* species in Brazil. In Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B.A. McPheron, G. Steck . Florida, USA. St. Lucie Press. p.37-42.
72. MARTINS, D.S.; ALVES, F.L.; ZUCCHI, R.A. 1993. Levantamento de moscas-das frutas (Diptera: Tephritidae) na cultura do mamoeiro no norte do Espírito Santo. Anais da Soc. Entomol. do Brasil (Brasil) 22(2): 373-379.(RAE 82(6) 5527)
73. MOLINEROS, J.; TIGRERO, J.; SANDOVAL, D. 1992. Diagnóstico de la situación actual del problema de las moscas de la fruta en el Ecuador. Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. (Ecuador), 53 p.
74. MORGANTE, J.S.; MALAVASI, A.; BUSH, G.L. 1980. Biochemical Systematics and evolutionary relationships of Neotropical *Anastrepha*. Ann. Entomol. Soc. Am. 73: 622-

630.

75. MORGANTE, J.S. 1991. Moscas das frutas (Tephritidae): Características Biológicas, Detecção e controle. Ministerio da Agricultura e Reforma Agrária / FAO . Bol. Tec. de Recomendações para os Perímetros irrigados do Vale do São Francisco, nº 2. 19 p.
76. _____; SELIVON, D.; SOLFERINI, V. N.; NASCIMENTO, A. S. DO. 1996. Genetic and morphological differentiation in the specialist species *Anastrepha pickeli* and *A. montei*. In *Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management*. Ed. by B. A. McPheron, G. Steck . Florida, USA, St. Lucie Press. p.273-280.
77. NAPPO. 1994a. Carambola fruit fly on the move. NAPPO Newsletter, 14(3): 5
78. NAPPO. 1994 b. Medfly outbreak in Chile. NAPPO Newsletter, 14(3): 5
79. NASCA, A.J.; FERNÁNDEZ, R.V.; HERRERO, A. J. DE; MANZUR, B.E. 1983. Incidencia de los tratamientos químicos para control de moscas de los frutos (Tryptidae) sobre crisópidos y hemeróbidos (Neuroptera) en plantas cítricas. CIRPON, Revista de Investigación (Argentina). 1(2): 47-73.
80. NASCIMENTO, A.S. DO; ZUCCHI, R.A.; NETO, S.S. 1983. Dinâmica populacional das moscas-das-frutas no recôncavo baiano. III. Análise faunística. Pesq. Agropec. bras., (Brasil). 18(4): 319-328.
81. _____ ; MORGANTE, J. S.; MALAVASI. A.; URAMOTO, K. 1993. Occurrence and distribution of *Anastrepha* in melon production areas in Brazil. In *Fruit Flies, Biology and Management*. Ed. by M. Aluja , P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 39-42.
82. NORRBOM, A.L.; KIM, K.C. 1988a. A list of the reported host plants of the species of *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae). USDA/APHIS/PPQ. Hyattsville, MD. 114 p.
83. _____ ; _____. 1988b. Revision of the shausi group of *Anastrepha* Schiner (Diptera: Tephritidae), with a discussion of the terminology of the female terminalia in the tephritoidea. Proc. Ent. Soc. Wash. 81(2): 164-173.
84. _____. 1991. The species of *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) with a *grandis*-type wing pattern. Proc. Ent. Soc. Wash. 93 (1): 101-124.
85. NUÑEZ, B.L. 1981. Contribución al reconocimiento de las moscas de la frutas (Diptera: Tephritidae) en Colombia. Revista ICA, Bogotá (Colombia). 16(4): 173-179.
86. OLALQUIAGA, F.G.; LOBOS, A. C. 1993. La mosca del Mediterráneo en Chile, introducción y erradicación. Ministerio de Agricultura de Chile. Servicio Agrícola y Ganadero. 268 p.
87. POLLONI, Y.J.; SILVA, M. T. DA. 1987. Considerations on the reproductive behavior of *Anastrepha pseudoparallela* Loew, 1873 (Diptera, Tephritidae). In *Fruits flies proceedings of the second international symposium*. 16 - 21 setember 1986. Ed. by A. P. Economopoulos. Crete, Greece, Colymbari. p. 295-301.
88. PORTILLA, M. M.; G. GONZÁLEZ; L. NUÑEZ-BUENO. 1995. Evaluación y descripción del daño ocasionado por *Ceratitis capitata* al café. Revista Colombiana de Entomología 21 (19: 15 – 24.
89. PRADO, C.E. 1991. Artrópodos y sus enemigos naturales asociados a plantas cultivadas en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA (Chile). Serie Boletín Técnico nº 169. 207 p.
90. PUTRUELE, G.; ABBIATI, N.N.; VACCARO, N.C. 1993. Soybean protein hydrolisate bait for medfly control. In *Fruit Flies, Biology and Management*. Ed. by M. Aluja, P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 369-373.
91. _____. 1996. Host for *Ceratitis capitata* and *Anastrepha fraterculus* in the northeastern province of Entre Ríos, Argentina. In *Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management*. Ed. by B.A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p.343-345.
92. QUEZADA, J.R. 1980. La "Avispa de la papaya" *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker (Diptera: Tephritidae). Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Depto. de Sanidad Vegetal. 15 p.
93. RAMOS, F.A.; CASTILLO, F. 1974. Evaluación de las poblaciones de *Ceratitis capitata* (Wied.) "moscamed" en el Valle de Palpa, Depto. de Ica. Avances en Investigación (Perú) 3 (2-3): 33-34.
94. ROHWER, G.G. 1992. Recomendaciones relativas a manejo / erradicación de moscas de la

- fruta en el Hemisferio Occidental. NAPPO - OIRSA. San Salvador, El Salvador, Boletín nº 10, 41 p.
95. ROSILLO, M.A. 1953. Resultados preliminares de un estudio bioecológico de los dípteros Trypetidae del noroeste argentino. Rev. Invest. Agric. (Buenos Aires) 7(2): 97-130.
96. ROSILLO, M.A.; PORTILLO, M.M. 1971. Factores que determinan el incremento de la densidad de población de las especies *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann) y *Ceratitis capitata* (Wiedemann). (Dipt. Acalypt.) Región citrícola de Bella Vista, Corrientes, Argentina. IDIA (Argentina) Nov. 1971, 287: 17-27.
97. ROSSI, M.M.; MATIOLI, J.C.; BUENO, V.H.P. 1988. Principais espécies de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) e sua dinâmica populacional em pessegueiros na região de caldas, sul Minas Gerais. Revista de Agricultura (Piracicaba) (Brasil), 63(3): 329-342. (RAE 80(4): 2697)
98. SALLES, L.A.B. 1991. Moscas-das-frutas *Anastrepha fraterculus* (Wied.) bioecología e controle. Pelotas: EMBRAPA - CNPFT. EMBRAPA - CNPFT. Documentos nº 41 ,16p.
99. SALLES, L.A.B. 1994. Períodos de ataque e de controle da Moscas-das-frutas em pessegueiro. Horti Sul, (Brasil) 3(1): 47-51.
100. SALLES, L.A.B. 1995. Bioecologia e controle da Moscas-das-frutas Sul-Americana. Pelotas RS: EMBRAPA - CPACT. 58p.
101. SANTOS, B.B. DOS. 1988. Artrópodos associados às plantas cultivadas no estado do Paraná. II. Cafeeiro e mandioca. Revista do Sector de Ciências Agrárias (Brasil), 10 (1/2): 27-28. (RAE 82(1) 701)
102. SAUERS - MULLER, A. VAN. 1991. An overview of the Carambola fruit fly *Bactrocera* species (Diptera: Tephritidae) found recently in Suriname. Florida Entomologist 74(3): 432 – 440.
103. SAUERS - MULLER, A. VAN. 1992. Carambola fruit fly in Surinamee. Caraphin News (IICA) 5: 1
104. SAUERS - MULLER, A. VAN. 1993a. Surinamee Carambola fruit fly survey. Caraphin News 8 p. 3
105. SAUERS - MULLER, A. VAN. 1993b. Pilot eradication project for the Carambola fruit fly in Coronie, Suriname. In Fruit flies, biology and management. Ed. by M. Aluja, P. Liedo New York, Springer-Verlag. p. 439-442.
106. SCHMID, M.L.; SANTOS, H.R.DOS. 1988. Levantamento de plantas hospederas de moscas das frutas no município de Piraquara-PR. Revista do Setor de Ciências Agrárias 10(1/2): 63-66. (RAE 82(1) 629).
107. SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA). 1999. Resolución SENASA Nº 299/99 del 10 de febrero de 1999, publicada en el Boletín Oficial Nº 29088 del 18 de febrero de 1999.(Argentina).
108. SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA). Programa Nacional de moscas de la fruta. Centro de producción y esterilización de moscas de la fruta. La Molina (Perú). 8p.
109. SILVA, J.G.; MALAVASI, A. 1996a. Life cicle of *Anastrepha grandis*. In Fruit fly pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B.A. Mc Pheron, G. Steck. Florida, USA, St Lucie Press. p. 347-351.
110. SILVA, N.M. DA; NETO, N.N.; ZUCCHI, R.A. 1996b. The natural host plants of *Anastrepha* in e State of Amazonas, Brazil. In Fruit fly pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B. A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p. 353-357.
111. SIMON, F.J.; RAMOS, F.A.; VELARDE, R.O.; GONZÁLEZ, A.P. 1972. Investigaciones sobre control de *Ceratitis capitata* W. por la técnica de insectos estériles en Moquegua, Perú. Rev. Per. Entomol. (Perú) 15(1): 1-21.
112. STECK, G.J.; CARROL, L.E.; CELEDONIO, H.; GUILLÉN, J. 1990. Methods for identification of *Anastrepha* larvae (Diptera: Tephritidae), and key to 13 species. Proc. Entomol. Soc. Wash. 92(2): 333-346.
113. _____. 1991. Biochemical systematics and population genetic structure of *Anastrepha*

- fraterculus* and related species (Diptera: Tephritidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 84(1): 10-28.
114. STEFANI, R.N.; MORGANTE, J.S. 1996. Genetic variability in *Anastrepha pseudoparallela*: A specialist species. In Fruit fly pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B.A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p. 277-280.
115. STEYSKAL, G.C. 1977a. Two new Neotropical fruitflies of the genus *Anastrepha*, with notes on generic synonymy (Diptera: Tephritidae). Proc. Entomol. Soc. Washington. 79(1): 75-81.
116. STEYSKAL, G.C. 1977b. Pictorial key to species of the genus *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae). Entomol. Soc. Washington. 35 p.
117. STONE, A. 1942. The fruitflies of the genus *Anastrepha*. United States Department of Agriculture Misc. Publ. 439: 1-112.
118. VACCARO, N.C. 1978. Insectos y ácaros obtenidos sobre plantaciones cítricas de los Departamentos de Concordia y Federación (Entre Ríos). III Jornadas Fitosanitarias Argentinas. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán, 1: 93-124.
119. VADORA, M.L.; SALAVERRY, L.; RODRÍGUEZ, L. 1993. Prediction of *Ceratitis capitata* captures based on climatic factors. In Fruit Flies, Biology and Management. Ed. by M. Aluja, P. Liedo. New York, Springer-Verlag. p. 211-216
120. VATTUONE, E.M.; C.N. PALMIERI. 1993. New attractants and traps trial for the capture of female of *Ceratitis capitata* Wied. "Province of Catamarca, Argentina". In Development of female medfly attractants systems for trapping and sterility assesment. Working material, second research coordination meeting. Madeira, portugal, January 1997. 59 p.
121. WHITE, I.M.; ELSON-HARRIS M.M. 1992. Fruit flies of economic significance: their identification and bionomics. Wallingford, UK; CAB International, Redwood Press. 601p.
122. ZAHLER, P.A. 1991. Moscas - das - frutas (Diptera: Tephritidae) em dois pomares de manga (*Mangifera indica*) do Distrito Federal: levantamento de espécies e fluctuação populacional. Revista CERES 38 (217): 206-216.
123. ZUCCHI, R.A. 1982. A new species of fruitfly of the genus *Anastrepha* Schiner, 1868 (Dip., Tephritidae) from Brazil. Anais Soc. Ent. Bras., 11(2): 251-254.
124. ZUCCHI, R.A.; SILVA, N.M. DA; NETO, S.S. 1996. *Anastrepha* species from the Brazilian Amazon: distribution, host, and lectotype designations. In Fruit Fly Pests, a world assessment of their biology and management. Ed. by B.A. McPheron, G. Steck. Florida, USA, St. Lucie Press. p. 259-264.
125. ZUCCHI, R.A.; E. L. ARAUJO; N. A. CANAL; M. A. UCHOA. 1999. La mosca sudamericana de la fruta *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann) en Brasil. In The South American Fruit Fly, *Anastrepha fraterculus* (Wied.); advances in artificial rearing, taxonomic status and biological studies. Proceeding of workshop, Viña del Mar, Chile. November 1996. FAO / OIEA. Pp. 5 – 11.

**Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – CENTRO REGIONAL ANDINO -
(Av. Paseo de la República 3211, piso 6 – teléfono 51.1.422.8336, fax : 51.1.442.4554, Lima,
Perú)**

13